

**雅若** 凝膠 (過氧化苯醯)  
50 毫克/公克  
**ACZO Gel** (Benzoyl Peroxide)  
50 mg/gm “*Sinphar*”  
—— 青春痘治療劑 ——  
(Antiacne Preparations)

本劑是一種溶水性乳白凝膠之配方，對於患部皮膚，有強力的乾燥作用，能滲入皮膚內組織，達到殺菌的效果，而去除面皰。

**【成分】**

**有效成分及含量：每gm含：**

**Benzoyl Peroxide.....50mg**

其他成分(賦形劑)：Carbomer、EDTA-2Na、Diocetyl Sodium Sulfosuccinate、Silicon Dioxide、Propylene Glycol、Poloxamer、Sodium Hydroxide、Water Purified.

**【用途(適應症)】**治療尋常性痤瘡(青春痘、面皰)。

**【使用上注意事項】**

- 1、有下列情形者，請勿使用：
  - (1) 曾因本藥成分引起過敏。
- 2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (1) 有深部皮膚組織感染。
  - (2) 12歲以下。
  - (3) 有敏感性皮膚。
- 3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (2) 正在使用其他外用痤瘡(青春痘、面皰)治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療。
- 4、其他使用上注意事項：
  - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2) 避免陽光直射。
  - (3) 勿超過建議使用量或使用次數。
  - (4) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
  - (5) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (6) 本藥僅能使用於痤瘡(青春痘、面皰)部位，不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
  - (7) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  - (8) 本藥勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (9) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  - (10) 使用前請使用於1~2個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。
  - (11) 塗抹部位應避免陽光曝曬，並避免與其他皮膚刺激原接觸。
  - (12) 避免接觸頭髮及染色布料，會使頭髮衣物褪色。

**【用法用量】**

成人及12歲以上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先將臉洗淨、擦乾，將藥品輕抹薄薄一層塗於患部。</li> <li>2. 一開始使用時1天1次，需要時再逐漸增加為1天2至3次。</li> <li>3. 若發生乾燥或脫皮，則降低使用次數為1天1次或2天1次。</li> </ol>
12歲以下	請洽醫師診治。

**【警語】**

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發紅、灼熱、發癢、腫脹、皮膚乾燥、脫皮、刺痛。

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (1) 若有上述外之其他不適情況產生。
  - (2) 同一部位使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
  - (3) 皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感未改善。

【包裝】 1000公克以下塑膠軟管裝、塑膠罐裝。

【儲存】 25°C以下保存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 034127號  
G-2414號



PIC/S GMP



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com