

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	益痔康栓劑	申請廠商	育新企業有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	043161 號

益痔康[®] - 栓劑

衛署藥製字第043161號
G-6791

alcos-anal[®] SUPPOSITORIES

益痔康(alcos-anal[®]) 刺激衰退結締組織的新生, 使痔核壁產生新的結締組織。這些新組織日漸收縮, 使痔核日漸縮小, 最後僅殘留一小形隆起之厚皮, 痔瘡即形治療。至於肛門之搔癢及濕疹, 在應用益痔康短時間內即可消失。

【適應症】痔瘡。

【用法】內痔：先除去栓劑外之包紙然後使用。因本栓劑之形狀細長，插入肛門並無困難，但如將栓劑先浸入水中，使表面潤滑，則插入更易。任何栓劑遇熱皆軟化。但浸入冷水後，即行堅實如初。

【類別】本藥須由醫師處方使用。

【注意】

1. 益痔康之有效成份能迅速擴佈於粘膜表面及皺摺處並發生治療作用。通常在短時間內疼痛即可消失，流血亦可停止。此即所謂症狀治療。
2. 即使症狀消失後，仍須繼續用藥數星期，以求根治，而防復發。根治之方法，最好於早晨、夜晚及便後各用藥一次。因為內痔與外痔常連帶發生，栓劑與軟膏如能同時使用，效力更佳。通常根治之時間總在6-8星期左右。
3. 初用藥時常有灼熱感覺，此即開始發生療效的現象。此種現象在用藥兩三日後即消失。
4. 便秘及堅硬之大便對痔瘡之治療常有很大的妨害，患者應養成每日大便的習慣，並保持大便的暢通。
5. 注意保持肛門之清潔，並使用軟質衛生紙。

【成分】每顆含：
Sodium oleate 200.0mg

【包裝】6-1000顆盒裝。

【儲存】請存放於陰涼處。

【賦形劑】Polidocanol、Chlorocarvacrol、Hard Fat、Sodium Hydroxide、Oleyl Oleate、Oxynex、Purified Water

委託者：育新企業有限公司
桃園市龜山區大湖里文三一街37號
製造廠：明德製藥股份有限公司
桃園市楊梅區民富路二段360號
MADE IN TAIWAN

