

"培力" **益欣** 凝膠 1.5%
Escein Gel 1.5% "P.L."

- 【成分】 每公克凝膠含有：Escein 15mg
- 【賦形劑】 Propylene Glycol, Diisopropyl Adipate, Lauromacrogol, 1,3 Butylene Glycol, Methylparaben, Carbomer 940, Sodium Hydroxide, Disodium Edetate, L-Menthol, Alcohol, Purified Water
- 【適應症】 改善慢性靜脈功能不全引起局部腫脹之輔助療法。
- 【用法用量】 取出約一豌豆之量，直接塗抹在要治療之病變處，如果病變範圍需要使凝膠均勻，請輕輕按摩腫脹部位，也可以棉花棒塗抹。五天內一天平均塗抹五次，本藥須由醫師處方使用。
- 【禁忌】 由於薄荷腦的存在，三十個月以下的兒童請勿用。請放在小孩拿不到的地方。
- 【作用】 Aescin由於具有活性素 β -Escein(其具有保護及振奮微血管微循環的性質)故有鎮痛及抗腫的作用。能使浮腫消失，促使毛細管膜恢復正常之滲透性，具有保護血管壁，特別是毛細管膜，並增強其抗滲透力；具有抗炎的性能，能矯正組織發炎症狀。
- 【儲存】 請儲存於25℃以下，避免冰凍。
- 【包裝】 1000公克以下塑膠瓶裝及塑膠軟管裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992

ESO-D_04