

13

79

61

61

59

“元宙” **炎必克** 口腔消炎噴液劑
1.5毫克/毫升

Meric anti-inflammatory spray 1.5 mg/mL “Y. C.”

衛署藥製字第047146號
GMP G-8648

成分

有效成分及含量: Benzydamine HCl 1.5 毫克/毫升
其他成分(賦形劑): Povidone、Methyl paraben、Brilliant Blue FCF、Sodium benzoate、Saccharin sodium、Sodium

bicarbonate、Strawberry flavor、Polysorbate 20、Alcohol、Purified water。

用途(適應症)

緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍。

使用上注意事項

- (一) 有下列情形者，請勿使用：
(1) 曾因本藥成分引起過敏。
(二) 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(1) 6

歲以下。(2) 肝腎疾病患者。
(三) 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：(1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(2) 正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。
(四) 其他使用上注意事項：(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。(2) 避免陽光直射。(3) 勿超過建議使用量或使用次數。(4) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。(5) 本藥不可連續使用超過7天。
(6) 請在保存期限內使用。

用法用量

年齡	劑量	
成人及12歲以上	每次噴4-8下	噴液劑直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5至3小時使用一次。
6歲以上未滿12歲	每次噴4下	
6歲以下	請洽醫師診治	

警語

(一) 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生。

身體部位	副作用
消化系統	嘴麻木、灼熱、刺痛、口乾及口渴、味覺改變、噁心、嘔吐、胃腸道不適
神經系統	頭昏、頭痛、嗜睡

(二) 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：全身過敏性反應，

如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚病、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣。

(三) 過量(依文獻記載)：尚無benzydamine HCl溶液過量的病例報告。即使不小心吞下本劑亦不可能產生全身性的不良反應。目前benzydamine無特定的解毒劑，若發生過量時，應針對其症狀來治療。

包裝 100毫升以下玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

類別 醫師藥劑生指示藥品。

儲存 直立貯存於25°C以下避光處。



“元宙”

炎必克 口腔消炎噴液劑
1.5毫克/毫升

請由此處翻閱說明書

【成分】

有效成分及含量：
Benzydamine HCl 1.5毫克/毫升

【用法用量】

請詳閱說明書後使用。
醫師藥劑生指示藥品。

直立貯存於25°C以下避光處

衛署藥製字第047146號

GMP G-8648



緩解口腔及喉嚨疼痛



草莓口味

【用途(適應症)】

緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍。

包裝規格：

批 號：

保存期限：



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL &
PHARMACEUTICAL CO., LTD
南投市南崗工業區南崗三路272號
TEL:049-2253190