

“紐約”新徽素軟膏 內衛藥製字第011122號

Neomycin Ointment "N.Y."

Neomycin Sulfate是一種廣效型抗生素，對多種革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌均有強力的抗菌效果。若就陽性菌類而言，本藥對於外傷化膿發炎的葡萄球菌制菌效果比對於鏈球菌的制菌效果更為顯著，對帶形菌屬及變形菌等感染也具同等的療效。本藥外用，細菌較少產生抗藥性、對人體副作用較低、對患部的刺激性較小。

【成分】

有效成分及含量

Each gram contains:

Neomycin Sulfate.....5 mg

其他成分(賦形劑): Polyethylene glycol 400、Polyethylene glycol 3350。

【用途(適應症)】

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

1. 3歲以下。

2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量或使用次數。

4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗淨後再用藥。

5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

8. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

10. 請勿使用超過7天以上。

【用法用量】

用法	用量
每天 2-4 次。	塗於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。
耳朵	耳毒性。
腎臟	腎毒性。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。

2. 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝，
450公克塑膠瓶裝。

【儲存條件】請於25℃以下陰涼處保存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。



人人化學製藥股份有限公司中壢廠
桃園市中壢區南園二路3號

