

松木舒敏凝膠

Pinetarsol Gel

衛部藥輸字第 026248 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【成分】

有效成分及含量：Tar 1.6% w/w (相當於每克含有 16 毫克的 Tar)

其他成分(賦形劑)：Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer、Cocamide DEA、Glycerol、Laureth-23、Laureth-4、Lauryl betaine、Patent blue V、TEA-lauryl sulfate、Triethanolamine、Water-purified、Dichlorobenzyl alcohol、Phenethyl alcohol、Methyl hydroxybenzoate

【用途(適應症)】

作為輔助療法：牛皮癬、濕疹、緩解皮膚搔癢。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 1. 對 Pine Tar 或本品之其它成分過敏者。
- 其他使用上注意事項：
 1. 本藥品只限外用，如身體、臉部及手部。請勿用於傷口。
 2. 使用時避免接觸眼睛，如不慎接觸眼睛，請以清水沖洗。
 3. 本品不應使用於：(1) 開放性的感染傷口 (2) 潰瘍或急性膿泡型乾癬。

【用法用量】

溫和塗抹於患部，於 2 到 3 分鐘後輕輕用水沖洗並拍乾，勿摩擦患部。

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激、發紅、光過敏現象

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 1. 過敏反應
 2. 皮膚問題惡化
 3. 不慎誤食

【藥物動力學】 依文獻記載

在一項使用多種煤焦油製劑於不同種類皮膚病患者的外用治療研究中，發現經由尿液排除之總多芳香環碳氫化合物顯著增加。在平均 7 天之療程中，於 9 至 90% 體表面積使用濃度 1.5% 至 40% 的煤焦油製劑。因此，有些煤焦油含有的碳氫化合物會經由皮膚吸收。最高吸收劑量會因為身體接受治療的區域面積與暴露時間長短而有不同。很多碳氫化合物藉由氧化與接合反應進行廣泛性代謝轉化，而藥物代謝酶(包含皮膚與全身性)可能會受煤焦油製劑誘發活性。

【包裝】

100 公克積層鋁塑軟管裝

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】

儲存溫度：30°C 以下。

【有效期間】 5 年

請參閱外包裝標示之保存期限。

【製造廠名稱】

Ego Pharmaceuticals Pty Ltd. 澳洲意高大藥廠

【製造廠地址】

21-31 Malcolm Road, BRAESIDE VIC 3195, AUSTRALIA (澳洲)

【藥商名稱】

台灣意高藥品有限公司

【藥商地址】

台北市內湖區瑞光路 188 巷 50 號 3 樓

【客服專線】

0800-000-023