



“瑞士”

易寧神 注射液50毫克/毫升（哈伯度）

BINISON injection 50mg/ml “SWISS” (Haloperidol)

“易寧神”注射液為一長效型精神安定劑，與口服及其他抗精神病用藥比較，不僅具有較長的作用期，能減少用藥頻率，並具有較低的錐體外副作用及得到較佳的吸收，對於急躁、激動、妄想、緊張、抑鬱等精神症狀，皆能有效控制，為一高優異性的抗精神病用藥。

【成份】 Each ml contains:

Haloperidol (as decanoate) 50mg

【賦形劑】 Benzyl Alcohol、Vitamin E Acetate 100%、Sesame Oil

【藥理作用】 1. Haloperidol decanoate 為長效型精神安定劑，其作用機轉為阻斷 dopamine 作用，並增加其代謝轉換速率。

2. 本品注射後，緩慢、持續地釋放出 Haloperidol，注射後的第六天達到血中最高濃度，半生期約三週，經過 3~4 次給藥後可得穩定血中濃度。

【適應症】 精神病狀態，躁病，噁心，嘔吐，攻擊性與破壞性之行為障礙，舞蹈病。

【用法用量】 深層肌肉注射，成人初劑量為每四星期一次，一次 1c.c.，初期最高一次劑量為 2c.c.，劑量依症狀酌予增減，每次劑量不宜超過 6c.c.，老年人初劑量每月一次，一次 0.5-1c.c.。本品限由醫師使用。

【警語及注意事項】

一、「抗精神病藥物惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS)：如同其他的抗精神病藥物，本藥與 NMS 有關。NMS 是一種罕見的特異體質反應，其症狀可能包括：發高燒、全身肌肉僵直、自主神經不穩定、神智改變等。高燒通常是此症狀的早期徵兆。此時應立即中止抗精神病藥物治療，給予適當支持療法並小心監測」。

二、曾有精神病患以 haloperidol 治療而發生猝死、QT 波延長(QT-prolongation) 和 torsades de pointes 之案例報告，尤其是比仿單建議更高的治療劑量和靜脈注射有較高的風險導致 QT 波延長和 torsades de pointes 發生。發生 QT 波延長、torsades de pointes 之高風險案例可能發生於無潛在危險因子之病患，但具有以下危險因子之病患必須特別注意，包括建議接受治療之前已有 QT 波延長情形之病患(包括電解質不平衡【特別是低血鉀和低血鎂】)、使用已知會引起 QT 波延長之藥物、心血管疾病、甲狀腺功能低下、QT 波延長之家族病史)。倘若 haloperidol 以靜脈注射途徑給藥，應監測病患之心電圖，追蹤其 QT 波及心律不整之情形。

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

三、副作用：治療初期偶有 1. 可逆性錐體外反應。

2. 間有暈眩，嗜睡，焦慮，精神激越等。

3. 高熱，精神惡化症。

4. 心悸，血壓變動。

四、下列病患謹慎使用：1. 嚴重心血管疾病者。

2. 使用抗癲癇藥或有癲癇病史及有 EEG 不正常病史者。

3. 過敏或過敏病史者。

4. 使用抗凝血劑者。

5. 甲狀腺毒症者。

五、若須同時使用抗巴金森劑，須在本藥停用後，方可使用。

六、本品不宜與鋰鹽及其他抗精神病用藥合併使用。

七、駕車及操作精密儀器患者，宜謹慎使用。

八、孕婦唯有在治療利益大於危險性時方可使用。

【儲存條件】 請儲存於 25°C 以下。

【包裝】 1,3ml/Amp, 100Amp 以下盒裝。