

“南光” 吉多士 5%
注射液 10%

5%
Gitose Injection 10% "N.K."

□成分：

5% Each ml contains : Dextrose Monohydrate50 mg

10% Each ml contains : Dextrose Monohydrate100 mg

□賦形劑：Water for Injection。

□適應症：急性傳染病患之水分補給、體液之增量。

□用法用量：本藥限由醫師使用。

通常每次500 ml靜脈點滴注射，但可依年齡及症狀酌予增減。

注意事項：

一、取用時：

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法：

1.請依輸液套使用方法正確使用。

2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲藏：本品應存放於陰涼處所。

□包裝：20，100，250，500，1000毫升玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋裝，
100支以下盒裝。

5% --- 衛署藥製字第 029835 號

10% --- 衛署藥製字第 029838 號



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號

TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845