

頭蓋內壓亢進·頭蓋內浮腫的降下劑

“南光”

固利壓 注射液

GLYCEROL Injection "N.K."

腦梗塞、腦內出血、蜘蛛膜下出血等的腦中風，以及腦腫瘍、頭部外傷等的中樞神經障礙，在急性期每有顱內壓亢進、腦浮腫現象出現，對此種發症初期的症狀，以有效且適當的處置是極為重要的。

本品是基於高滲透壓性脫水作用(直接作用)，以及利用Glycerol為能量介入腦代謝過程中，以促進代謝的改善(間接作用)，迅速的呈現顱內壓下降、腦浮腫消失及腦血流獲得改善等效果。

□成分：Each ml contains:

Glycerin	100 mg
Fructose.....	50 mg
Sodium Chloride.....	9 mg

□賦形劑：Sterile water for Injection。

□特性：pH：3.0~6.0

滲透壓比：約 7 (與生理食鹽水相比)

□作用：

- 1.可以經由高滲透壓性脫水作用降低腦內壓。
- 2.可以減少腦脊髓液的產生。
- 3.可以增加腦血流至腦部的缺血部位。
- 4.增加腦的氧氣消耗量，改善腦組織的代謝。
- 5.降低眼球的前房內壓與晶狀體內壓

□適應症：

降低顱內壓、腦水腫。

□用法用量：本藥限由醫師使用。

一日1~2次，每次250~500 ml，連續投與1~2週。500 ml的量靜脈點滴所需要的時間約為2~3小時。

□注意事項：

◆禁忌：遺傳性果糖不耐症的患者。

◆需慎重投與：1.有心臟、循環系統機能障礙的患者

2.有腎障礙的患者

3.尿崩症的患者

4.糖尿病的患者(有可能產生非酮性高滲透壓昏睡)

◆給高齡者投與時：

一般高齡者因為很多是生理機能低下，因此在投與時，對水、電解質異常要留意，並慎重地投與。

◆副作用：

- 1.大量、急速投與時，會產生乳酸酸中毒。
- 2.偶而會出現尿潛血反應、血色素尿、血尿。
- 3.有時會產生高鈉血症、低鉀血症、頭痛、噁心、口渴，或是較少出現的倦怠感。

◆一般的注意：

- 1.對於被懷疑為硬膜下、硬膜外血腫之患者，先處理出血源，並確認沒有再出血的疑慮之後，方可投與。(如果事先並未確認血腫的存在與否，即驟然投與，雖因頭蓋內壓的下降可暫時止血，但仍會再出血)。
- 2.因含食鹽故對需要限制食鹽攝取的患者，投與時須注意。
- 3.因含果糖，故大量、急速投與時，應注意會產生乳酸酸中毒。

◆使用上的注意：

- 1.眼科手術中，因會引起尿意，故希望手術前先行排尿。
- 2.本品在攝氏零度以下會結凍，使用前，請先微溫令其解凍，然後俟溫度降到體溫附近時，即可進行注射。

3.使用方法：

(1) 取用時：

- a. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- b. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2) 輸液套選用及插入法：

- a. 請依輸液套使用方法正確使用。
- b. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲 藏：本品應於室溫(15-30℃)保存之，避免過熱或過冷。

□包 裝：100，200，250，300，500，1000毫升玻璃瓶及塑膠軟袋裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 024986 號

