

非麻醉性止痛劑

## “應元”力克痛 注射液 20公絲/公撮 (尼夫平)

Licopam Injection 20mg/ml “Y.Y.” (Nefopam)

“力克痛注射液”是一種最新合成一非麻醉性止痛劑，對於劇烈疼痛具有完全止痛作用，本劑止痛作用與劑量有關，可依症狀輕重，酌量增減使用劑量。

化學式：3, 4, 5, 6, -Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2, 5-benzoxazine hydrochloride。

【成分】 Each ml contains:

Nefopam HCl.....20mg

賦形劑：Benzyl alcohol，Water for Injection。

【適應症】

鎮痛。

【用法用量】

一日三次，每次1Amp(20mg)依病情需要可酌量增減，肌肉注射(IM)每4~6小時可注射1Amp(20mg)靜脈注射(IV)每4~6小時可注射1/2Amp(10mg)，行肌肉或靜脈注射時應緩慢注射之，注射時及注射後15分鐘內患者須靜躺。

本藥限由醫師使用

【注意事項】：1. 禁忌症：(1)對曾患有暈厥症病歷之患者。(2)不能使用於心肌梗塞之患者。  
2. 警告：(1)妊娠期：雖在動物試驗尚未發現畸形胎，但本劑如他藥一樣，於妊娠前三個月內使用時宜謹慎；人類哺乳期使用本劑之資料尚缺乏，故使用時宜小心衡量其優點以及對母子所可能造成之損害。  
(2)兒童：十二歲以下兒童之安全性和療效，尚未確立。  
3. 注意：(1)如使用於患有青光眼、尿滯留或肌功能及腎功能障礙的患者，須慎重投與。(2)對正使用 MONOAMINE OXIDASE 抑制劑的患者，不宜使用。  
4. 副作用：(1)一般常見之副作用為噁心、頭暈倦睡口乾，次為盜汗、神經過敏、失眠、嘔吐。(2)使用注射劑型時，注射部位會有疼痛感。  
5. 過量：目前尚無使用過量之報告，故並無特殊解法，倘有過量發生時，宜採用支持療法，包括洗胃、使吐、利尿。

【貯存】

25°C以下貯存。

【包裝】

1公撮 100安瓿盒裝。



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06) 2654883 (代表號)