

## "政德" 樂華淨 注射劑 1gm Lofatin Injection 1gm "Gentle"

本品係一種新型 Cephalosporin(頭孢子菌素)系抗生素，其特徵在構造式 7 位上有 Methoxy group，具有對 B-lactamase，penicillinase，Cephalosporinase 高的安定性不易產生抗藥性構造式 3 位不含 MTT(1-Methyl -1H Tetrazole-5-Thiol)側鏈故無延遲凝血時間等之副作用。本品具有對抗嗜氣及厭氣之 G(+)及 G(-)細菌之廣效抗菌作用。對混合感染中最常見的 *Bacteroides fragilis*(此種混合感染對 Penicillins，Aminoglycosides，cephalosporins 均有抗藥性)本品具有良好之效果。對能產生 Penicillinase 及對 Spectinomycin 具有抗藥性之淋球菌亦相當有效。

「成份」：每 Vial 含

主成分：

Cefoxitin(as sodium)..... 1000mg(potency)

賦形劑：

無

「適應症」：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染性。

「用法用量」：

通常成人一日 2~4g 分 2~4 次，加蒸餾水、生理食鹽水行靜脈或點滴注射，或加 0.5% Lidocaine 稀釋後行深部肌肉注射。本藥限由醫師使用。

「注意事項」：

1. 一般注意事項：須先做休克之過敏試驗。

2. 禁忌：對本藥曾發生休克之患者。

3. 慎重投與：

(1)曾對 Penicillin 系或 Cepha 系藥物過敏者。

(2)本人或雙親及兄弟中有人具有支氣管痙攣、發疹、蕁麻疹等過敏性體質者。

(3)嚴重腎障害之患者。

(4)經口攝取不良或非經口營養之患者，高齡者、全身狀況不良之患者。

4. 副作用：

(1)休克，須小心觀察若有不快感、口內異常感、耳鳴、眩暈、便意、噁鳴、發汗等現象應停止用藥。

(2)過敏症，發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴節腫脹、關節痛等症狀應停用並適當處理。

(3)血液：顆粒球減少，好酸球增多，血小板減少，溶血性貧血。

(4)肝臟：出現黃疸、SGOT、SGPT、alkaline phosphatase 上昇。

腎臟：間有 BUN creatinine 上昇，乏尿、蛋白尿等腎障礙之現象出現，須詳細觀察若有異常現象出現須適當處置。

(5)胃腸：發熱腹痛，白血球增多、伴有粘液及血液便等急性下痢症狀的嚴重大腸炎、內視鏡檢查可看見偽膜斑形成，出現偽膜性大腸炎。腹痛及頻回的下痢應即停藥並做適當處置，此外有噁心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食慾不振、胃部不快感。

(6)菌交代症：口內炎、念珠菌症。

(7)維他命缺乏症：維他命 K 缺乏症(低 Prothrombin 血症，出血傾向)維他命 B 群缺乏症(舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎)。

(8)其他：頭痛、目眩、全身倦怠。

5. 對孕婦之安全性尚未確立，須基於有益性之判斷再使用。

6. 臨床檢查值之影響。

(1)除了 Test Tape 外 Benedict 氏、Fehling 氏液及 clinitest 的尿糖檢查值呈偽陽性。

(2)Creatinine 的測定，使用 Picric acid 反應的測定值會上升。

(3)BCG 法測定 Alubumin 會與 Alubumin 及 BCG 結合發生競合阻害測定值減低。

(4)直接 coombs 試驗呈陽性。

7. 使用上注意：

(1)靜脈內大量投與會引起血管痛、血栓靜脈炎，預防方法須注意注射液之調製，注射部位及注射方法，減慢注射速度。

(2)溶解後須儘速使用，若須保存時在室溫可保存 24 小時，在冷藏庫可保存 5 天以內使用。

8. 室溫遮光保存有效期間三年。

「包裝」：

100 支以下小瓶盒裝。(每瓶 1 公克裝)



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號