

綜合電解質注射液
“大塚”
台大注射液

本藥限由醫師使用

“大塚”台大 1 號注射液 衛署藥製字第 021632 號 “大塚”台大 3 號注射液 衛署藥製字第 021629 號
“大塚”台大 2 號注射液 衛署藥製字第 021630 號 “大塚”台大 4 號注射液 衛署藥製字第 024258 號

台大 1,2,3,4 號注射液，係根據台大醫學院附設醫院小兒科之處方所製成之產品，為綜合電解質及基礎營養補充液，可使下痢症之治療更安全、方便和有效。

各注射液之差異，主要在於 Na 之濃度。其組成如下。因其含有醋酸鈉、醋酸鉀、磷酸鈉及氯等，故不需另外添加就可立即使用。

[組成]: W/V%

成分 品名	NaCl	CH ₃ COOK	CH ₃ COONa	MgCl ₂ · 6H ₂ O	KH ₂ PO ₄	NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O	Glucose (C ₆ H ₁₂ O ₆)
台大 1 號	0.097	0.118	0.066	0.030	0.082	-	3.8
台大 2 號	0.152	0.118	0.066	-	-	0.083	3.3
台大 3 號	0.357	0.118	0.066	-	-	0.083	2.0
台大 4 號	0.596	0.079	0.066	-	0.164	-	0.8

賦形劑: NaHSO₃、HCl、Water for injection

[電解質量]:

品名	電解質 mEq/L						Glucose g/L	Osmolality mOsm/L	pH
	Na	K	Mg	Cl	Acetate	Phosphate m mole/L			
台大 1 號	25	18	3	20	20	6	38	300	4.0~7.5
台大 2 號	40	12	-	26	20	6	33	287	4.0~7.5
台大 3 號	75	12	-	61	20	6	20	285	4.0~7.5
台大 4 號	110	20	-	102	16	12	8	300	4.0~7.5

[適應症]:

台大 1 號：水份、電解質、養份補充、新生兒維持液。

台大 2 號：高張性下痢及小兒下痢之水份、電解質、養份補充。

台大 3 號：水份、電解質、養份補充、維持液等張性下痢及真性糖尿病引起之酮病的治療。

台大 4 號：低張性下痢時之水份、電解質、養份之補充。

[用法·用量]:

通常一回 500mL，靜脈內點滴注射，得依年齡症狀做適宜之增減。

[注意事項]:

(1)取用時：

①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或膠塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

②本品為無色~淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法：

①請依輸液套使用方法正確使用。

②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

[包裝]:

250、500、1000mL 塑膠瓶裝、PP 軟袋裝。

[貯存]:

30°C 以下貯存。

[有效期限]:

請見容器或外箱上之標示。



藥商：台灣大塚製藥股份有限公司

地址：台北市中山區復興北路 378 號 11 樓

製造廠：台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠

地址：桃園市中壢區吉林路 15 號

IP15-1812