

衛署藥製字第021709號

抗胞漿素(Plasmin)劑

"壽元" 妥敏爽注射液 (妥內散敏)

Tranexamic Acid Injection "S.Y."

【成分】每mL含：

Tranexamic Acid.....50mg

賦型劑：Water for Injection

【作用】

1. 抗胞漿素(Plasmin)作用：本劑經生體內及生體外試驗皆顯示有抗Plasmin作用。
2. 抑制出血作用：由於具有抗Plasmin作用，可阻止纖維素溶解酵素作用，而抑制出血。
3. 抗過敏性作用及抗炎症作用。
4. 毒性低。

【適應症】

全身及局部出血或出血性疾病。

【用法用量】

通常成人1日250~500mg(5~10mL)分1~2次靜注或肌肉

注射，手術中，手術後如有必要1次500~1000mg(10~20mL)靜注，或500~2500mg(10~50mL)點滴靜注，本藥限由醫師使用。

【注意】

1. 給下列病人服用時宜慎重：有血栓症之病人（腦栓塞、血栓性、靜脈炎等）及有引起血栓症之虞之病人。
2. 副作用：
  - (1)胃腸方面：有時噁心、食慾不振、下痢、胃中燒灼感（口服時而已）。
  - (2)皮膚方面：有時有搔癢、發疹現象。
  - (3)其他：昏昏欲睡感。
3. 使用時注意事項：宜緩慢地靜脈注射（如急速注射，偶或有噁心、胸內不舒感、心悸亢進、血壓降低等現象）（注射時而已）。

【包裝】

2mL×100A 5mL×50A 20mL×10A 20mL×50A

壽元化學工業股份有限公司  
嘉義市新民路128號