

愛克痰<sup>®</sup> 顆粒 20 毫克/公克

Actein<sup>®</sup> Granules 20 mg/gm

### 【特性】

- 本品係採用新型之祛痰劑 Acetylcysteine 為主成分，所研合而成之顆粒。
- Acetylcysteine 能幫助黏液(例如：痰液)分解，降低痰的黏稠度而容易排出。

### 【成分】

有效成分及含量

每公克中含有：

Acetylcysteine ..... 20 mg.

其他成分(賦形劑)

Dextrose、Sunset Yellow FCF、Orange Powder

### 【用途(適應症)】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

### 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
  - (二) 3 歲以下。
  - (三) 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 65 歲以上。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (一) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。
  - (四) 不得與含酒精飲料併用。
  - (五) 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

### 【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	成人每次 10 公克 (2 包)，一天 3 次。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。

3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

### 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情形產生。

(二) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發情形。

(三) 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

偶有發疹等過敏症狀。

其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

### 【包裝】

60-1000 公克塑膠瓶裝、12-200 包鋁箔盒裝(每包 5 公克)。

### 【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品

### 【貯存條件】

本品極易吸濕，請貯存於 25°C 以下乾燥處所。

衛署藥製字第 027177 號

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

