

"培力" **佑汝** 膠囊 2.5 毫克
GESTRIN CAPSULE 2.5mg "P.L."

【成分】每顆含有Gestrinone 2.5mg

【賦形劑】Lactose, Potato Starch, Sodium Starch Glycolate, Talc

膠囊殼：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Erythrosine, Titanium Dioxide, Tartrazine

【適應症】子宮內膜異位

【用法用量】

- 1.本藥須由醫師處方使用。
- 2.本藥一般用量為每週二次，每次服用一顆。於月經週期第一天服用第一顆，三天後服用第二顆，此後，固定於每週的相同二天，且最好於相同時間服用本藥。
- 3.如果忘記服藥一次，則於發覺時立即服用，並持續每週二次服藥。如果忘記二次或更多次，則立即停止服藥並告知醫師。如果誤服過多劑量，應立即告知醫師。

【注意事項】

- 1.若有下列情形請勿服用本藥：
 - a.懷孕或打算懷孕
 - b.哺乳嬰兒期間
 - c.患有心臟、腎臟或肝臟疾病
 - d.曾接受荷爾蒙類藥物治療，包括服用避孕藥，而曾有不適症狀者
- 2.應告知醫師所有正在服用之藥物，包括自行購買的藥物，因為某些藥物，包括避孕藥、治療癩癩及結核病的藥品，可能會干擾本品的作用。若有必要醫師可修改處方。
- 3.本藥不是避孕藥，不可作為避孕用途。如欲避孕者於治療期間應避孕(但不可服用口服避孕藥)。

【副作用】

- 1.任何治療方式都可能副作用。本藥的副作用能包括皮膚產生斑點、粉刺及油膩、體重增加、食慾改變、熱潮紅、頭痛、痙攣、神經過敏、抑鬱及腸胃不適，也有一些患者有性慾、乳房大小、聲音等改變及體重增加的報告。
- 2.若發覺對本藥有不適反應或有任何問題，應與醫師或藥師討論。

【說明】本品為一合成之類固醇荷爾蒙，具有抗黃體脂酮性質，可治療子宮內膜異位。

【儲存】25°C以下密封避光儲存，並應置於孩童不易觸及處。

【包裝】2~1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992

GSP-D-1_02

病患使用須知

服用藥物前請先仔細閱讀此病患使用須知

這份病患使用須知只是概括性的說明，關於此藥品的資料相當多，無法一一登載於此份須知上；假如妳對此藥有任何疑問，或是妳想知道更多相關的資訊，請詢問妳的醫師或藥師，他們可以提供妳更多有關於此藥物的資訊。

請將此份病患使用須知保存下來，日後也許妳會再重新閱讀一次。

妳吃的“培力”佑汝膠囊是甚麼？

“培力”佑汝膠囊須經由醫師處方開出的處方藥，是一種口服治療子宮內膜異位症之藥物。每顆膠囊含有主成分Gestrinone 2.5mg，另外含其他賦形劑。Gestrinone是一種合成的荷爾蒙，具有抗黃體激素的效果。此荷爾蒙製劑並非避孕藥，所以不可以當作避孕藥使用；服用此藥期間，必須做好相關的避孕措施（須排除服用避孕藥避孕），所以服用此藥前，請與妳的醫師討論相關的避孕措施。

妳適合服用這個藥嗎？

服用藥物前，請先閱讀下列文字，假如以下任一項，妳的回答為“是”的話，請妳一定要告知妳的醫師。

- * 妳對此藥物的成分曾經有過不良反應或過敏嗎？
- * 妳正計劃懷孕或已經懷孕嗎？
- * 妳正在哺乳嗎？
- * 妳有心臟、腎臟或肝臟方面的疾病嗎？
- * 妳以前曾經接受荷爾蒙相關的治療（包括服用避孕藥丸）嗎？如果有，妳對荷爾蒙相關的治療有任何不適嗎？
- * 妳現在有在服用任何口服避孕藥嗎？
- * 妳是糖尿病患嗎？

妳有服用任何其他藥物嗎？

請告知醫師妳正在服用的任何藥物，包括妳自行購買的非處方藥物，這是非常重要的。因為某些藥物，包括避孕藥、抗癲癇藥物、結核病藥物(Rifampicin)等會與Gestrinone產生交互作用，醫師知道情況並權衡利弊後，會做出最適當的決定。

妳該如何服用佑汝膠囊呢？

假如醫師指示妳服用此藥，那正確的服藥方式是非常重要的。通常，妳只需要一個星期服用二次，第一顆藥物在月經周期的第一天服用，三天後再服用第2顆藥物，從此以後，每個星期的相同二天服用佑汝膠囊直到療程結束，通常需要持續服用6個月，若有其他不清楚的地方，請詢問藥師或衛教人員。

假如忘記服藥怎麼辦？

當妳想起來的時候趕緊服用一顆佑汝膠囊，然後繼續每週二次用藥；假使妳忘記服藥超過二次，停止用藥並詢問妳的醫師。

假如服用過多藥物該怎麼辦？

假如妳不小心服用過多藥物，請馬上聯絡妳的醫師或藥師。

關於副作用：

任何治療都可能發生副作用，佑汝膠囊可能有的副作用包括點狀出血、痙攣、皮膚油膩、體重增加、食慾改變、掉頭髮、潮紅、頭痛、關節疼痛、痙攣、神經質、情緒低落及胃部不舒服（便秘、腹瀉）。

某些研究或文獻指出，少部份人會發生性慾、乳房大小及聲音改變或體毛增加，另外也有可能會有肝功能指數異常、增加體液滯留、水腫及感覺腫脹等。

假如妳覺得藥物引起的反應相當不適，請將症狀與妳的醫師或藥師討論。

妳該如何儲存妳的藥物？

將藥物避光儲存在25°C以下，若藥物已過期，請勿服用。

不可將藥品放在小孩拿得到的地方。

假如妳的醫師告知妳停止治療，請將剩餘的藥物拿回給藥師。

謹記，此藥只有在醫師處方下才可使用，請不要將此藥拿給他人使用，縱使她的症狀與妳相同。