

凱光錠 600毫克 (帕芝奎)

KAICIDE Tablets 600mg (Praziquantel)

本品主成分Praziquantel為一廣效性殺腸蟲劑，藥性安定、毒性低，對人類會感染之所有分體吸蟲 (Schistosomes)，腸內條蟲 (Cestodes) 均有良效，尤其是對中華肝吸蟲 (Clonorchis sinensis) 及衛氏並殖腺吸蟲 (Paragonimus westermani) 更有顯著之療效。本品經口服後在胃腸道中被迅速吸收、代謝，投藥後1~2小時即可達到最高血中濃度，80%之劑量於24小時內由尿中排出。

【成分名 (中文名)】


Praziquantel (帕芝奎)

【劑型、含量】

錠劑：每錠含Praziquantel (600 mg)

【化學性質】

Praziquantel為一含有苦味之無色粉末，其結構為



【適應症】

由血吸蟲屬感染引起的病症：埃及血吸蟲、日本血吸蟲、中華肝吸蟲、肺吸蟲。

【用法用量】

如下表，隔4~6小時服用。

寄生蟲	每次劑量 (每公斤體重)	每天服用 次 數	服用 天數
中華肝吸蟲 (Clonorchis sinensis)	25mg/kg	3	1
埃及分體吸蟲 (Schistosoma haematobium)	20mg/kg	2	1
曼氏分體吸蟲 (Schistosoma mansoni)	40mg/kg	1	1
日本分體吸蟲 (Schistosoma japonicum)	20mg/kg	3	1
衛氏並殖腺吸蟲 (Paragonimus westermani)	25mg/kg	3	2
短小包膜條蟲 (Hymenolepsis nana)	25mg/kg	1	1
牛肉條蟲及豬肉條蟲 (Taenia saginata & Taenia solium)	10mg/kg	1	1
澗節雙槽條蟲 (Diphyllobothrium latum)	25mg/kg	1	1
豚囊蟲 (Cysticercus cellulosae)	25mg/kg	3	4

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】

- 1.本品催畸性之研究資料尚未充分，孕婦及授乳婦應避免使用。
- 2.服藥後偶有短暫眩暈、頭痛、嗜眠、嘔吐、腹瀉等現象。

【賦形劑】

Potato starch, Lactose, Avicel, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Talc

【包裝】

2~1000粒瓶裝。

衛署藥製字第029833號

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司
地 址：新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司
地 址：台中市南屯區寶山里工業區 23路21號