

刻見清粉劑

Klean-Prep Powder

衛署藥輸字第 021441 號

| | | |
|---------|--------------------------|---------|
| 主成分：每包含 | Polyethylene Glycol 3350 | 59.00g |
| | Sodium Sulfate Anhydrous | 5.685g |
| | Sodium Bicarbonate | 1.685g |
| | Sodium Chloride | 1.465g |
| | Potassium Chloride | 0.7425g |
| | Aspartame | 0.0494g |

適應症：腸道檢查、手術前淨腸。

用法用量：每包須以一公升水配置成溶液，以口服給予。

建議用藥前2小時不要進食食物，直到相關檢查或手術結束。

成人（包括老人）應遵照醫師指示，選擇以下任一方式服用：

檢查或手術前一天傍晚一次服用

每包須以一公升水配置成溶液，每10至15分鐘喝250毫升，至排出液澄清或服用4包量為止，但需在4至6小時內服用完畢。

分為兩次服用

每包各以一公升水配置成溶液，2包（配置的溶液2公升）於檢查或手術前一天傍晚服用；剩餘2包（配置的溶液2公升）於檢查或手術當天早晨服用。建議最後一杯溶液至少在進行檢查前一小小時喝完，以確保完全排淨。

若以鼻胃管投予者，其速率為每分鐘20至30毫升。

腎功能不全之病人無須更改劑量。

兒童：不建議使用。

配伍禁忌：1. 對本藥品之主成份或賦形劑過敏者。

2. 充血性心臟衰竭(NYHA grades 3 and 4)。

3. 嚴重腎臟功能不全。

4. 已知或疑似胃腸道阻塞、穿孔、腸塞、胃滯留、急性胃腸潰瘍、毒性結腸炎、巨結腸。

5. 體重低於20公斤者。

警語：1. 對失去知覺或半清醒的病人或俯臥式呼吸者或會反胃的病人應特別注意，使用鼻胃管的病人亦須要特別注意。

2. 開始使用本藥品之前應對潛在腎功能不全的病人(例如急性心肌梗塞或不穩定性心絞痛，老年人或疲勞過度的病人)執行利益-風險評估。

3. 本藥品使用於活躍性腸道炎症者應特別小心。

4. 雖然與本等滲透壓產品並無關係，對非常少數產生電解質混亂的潛在風險患者在使用本藥品時應特別注意電解質變化的狀況(例如腎衰竭的病人、心臟衰竭或同時服用利尿劑的病人)。

這些病人於治療時應維持適當的水合狀態(hydration)。使用前及治療後應注意電解質的變化。

5. 如感覺腹脹或疼痛，本藥品之投與速度應減緩。

6. 本品含阿斯巴甜(aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(phenylketonuria)不宜使用。

7. 對孕婦亦需考慮是否使用之，使用時應特別注意。

交互作用：所有口服藥物均須於服藥前至少1小時使用。

懷孕及授乳：無懷孕時期使用之相關數據。對孕婦亦需考慮是否使用之，使用時應特別注意。

副作用：腹痛、腹脹。噁心、嘔吐、肛門刺激感過敏反應如出疹，蕁麻疹及水腫。

注意事項：1. 配製成的溶液應冷藏(2-8°C)且須於24小時內使用完畢。剩餘或不用之溶液須丟棄。

2. 本藥須由醫師處方使用。

包裝：單一劑量，4包一盒裝。

貯存：25°C以下，乾燥貯之。

製造廠：Helsinn-Birex Pharmaceuticals Limited
Damastown Mulhuddart Dublin 15 Ireland

藥商：台灣美強股份有限公司
台北市南京東路二段66號4F



Klean powders 刻見清藥粉 使用說明(注射止痛劑病患)

檢查時間：____年____月____日(星期____)____午____時____分

* 假如清腸不完全，導致殘餘糞便覆蓋於小病灶上(如息肉或小型癌)將使您的檢查完整性大打折扣，因此請務必依下列清腸劑服用方式清腸。

一、檢查前飲食注意事項

1. 檢查前一、二天宜進食低渣飲食如稀飯, 麵條, 蛋花湯, 或白吐司, 不宜吃任何高纖、高蛋白食物(青菜、水果、肉類、豆腐、麵筋、奶製品...等), 忌服牛奶、其他乳製品與任何有渣食物及色素較深之飲料(如葡萄汁, 胡蘿蔔汁, 蕃茄汁, 西瓜汁等)。
2. 檢查前一天晚餐請進食清流質飲食, 例如: 清粥、魚湯、運動飲料或濾渣果汁。

二、刻見清藥粉服用方法


1. 請將 2 包藥粉溶於 2000 C.C. 開水。
2. 檢查時間為上午者, 請於當天早上 5 點開始喝, 需在 2 小時內喝完。
3. 檢查為下午者, 請於檢查當天早上 8 點開始喝, 需於 2 小時內喝完。
4. 為避免脫水, 檢查前仍可持續喝清流質飲料。

如何分辨清腸乾淨與否:

一定要排瀉至糞水呈澄清透明色才算乾淨, 若糞水還是為黃橙色, 請繼續補充水份~~

註:

1. 如有長期服用高血壓及抗癲癇藥物, 請喝少量開水將藥物服下(降血糖藥物請暫停服用)。
2. 極少數個案服下瀉劑後會有噁心、嘔吐或腹脹肛門刺激感是正常的短暫現象; 您可稍作休息至症狀減輕後再繼續服用。
3. 服藥後大約 30-60 分鐘左右開始瀉下, 作用時間約 2-4 小時, 因個人體質或有習慣性便秘者, 排便時間可能延後。
4. 多次排便易造成肛門不適, 建議排便後用水沖洗肛門, 少用衛生紙擦拭。
5. 先天性巨結腸症、腸阻塞、鬱血性心衰竭、腹水等疾病之病患請勿使用本瀉劑, 並請主動告知醫護人員。



內視鏡室聯絡時間與電話: 星期一至五 8:00-17:00, 星期六 8:00-12:00

電話: (04)22052121 轉 2221