



“培力” **尼卡平** 糖衣錠 20公絲【尼卡第平】  
**Nicarpine s.C Tablets 20mg "P.L."(Nicardipine)**

【成分】本品每錠含有：

Nicardipine Hydrochloride.....20mg

【賦形劑】Lactose, Potato Starch, Magnesium Stearate, Gelatin, Sucrose, Povidone K-30, Sodium Starch Glycolate, Tartrazine, Carnauba Wax, Dibasic Calcium Phosphate

【適應症】高血壓。

【用法用量】1次1錠(20mg)1天3次服用，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1.一般注意

本品為鈣離子拮抗劑，急速停藥，將使症狀惡化的報告，要徐徐減量，十分注意觀察才可停藥。同時患者未經醫師指示，不可以中止服藥。

2.禁忌

- 頭蓋內出血在推定止血尚未停止的患者。
- 對於患者中急性期頭蓋內壓亢進的病人。

3.慎重投藥

- 有肝腎機能障害的患者。
- 低血壓症的患者。
- 有線內障的患者。

4.副作用

- 內服時有些患者肝臟方面的Bilirubin, GOT, GPT及Alkaliphostase有上昇的現象，若有認定為異常時就要中止服藥。
- 腎臟的BUN及Creatine値上昇出現，若有異常的認定也要停藥。
- 血液系統有顆粒性白血球減少現象。
- 消化系統引起噁心、嘔吐、胃部不快感、食慾不振、口渴、便秘、下痢、腹痛。
- 循環系統有顏面紅潮、熱感、血壓低下、浮腫、倦怠感、頻脈。
- 其他方面有頭痛、耳鳴、傾眠或不眠、胸部不快感、流涎、頻尿。

5.妊婦及授乳婦的投藥

動物實驗於妊娠末期投藥時，使出生兒體重減少及增重抑制現象，對妊婦及妊娠中應避免使用。同時本品會向母乳中移行，授乳時要避免用藥。

本品對未熟兒、新生兒、乳兒及幼小兒使用的安全性尚未確立。


6.相互作用

- 併用其他的降壓劑，將使作用增強。
- 本品併用Digoxin劑時將使血中濃度上昇。

7.其他

本品以老鼠作實驗，經口投藥，24個月使用45mg/kg/日的劑量（臨床用量的40倍）後，發現雄性老鼠的甲狀腺濾泡的腫脹比對照群相比，呈現有意義的增加現象。

【本質】Nicardipine HCl為帶黃綠色的結晶性粉末，無臭，帶有苦味。易溶於甲醇，冰醋酸及氫仿中，可溶於無水酒精中，難溶於水，無水醋酸及丙酮，完全不溶於乙醚，苯及Hexane中，具有如下的構造式：



【藥效及藥理】本品具有血壓下降作用內服本品的實驗動物有明顯的血壓下降作用，長期間投藥下也不會產生耐藥性，同時顯示持續的降壓作用。

【儲存】25°C以下，於原包裝儲存。

【包裝】6~1000粒瓶裝，鋁箔盒裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992