

"優生" 循妥斯 糖衣錠100公絲/持續性錠400公絲
(配妥西菲林)

Pentop S.C. Tablets 100mg/S.R. Tablets 400mg "Y.S."
(Pentoxifylline)

衛署藥製字第034364號 G.M.P G-2531
衛署藥製字第041535號 G.M.P G-5935

【成分名】Pentoxifylline

【劑型、含量】

循妥斯糖衣錠100公絲：每錠含Pentoxifylline 100mg
循妥斯持續性錠400公絲：每錠含Pentoxifylline 400mg

【臨床藥理】

Pentoxifylline可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(first-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】末梢血管循環障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用

1. 通常成人劑量，一天3次，每次100-400毫克，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
2. 雖然在治療2-4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
3. 有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【注意事項】

1. 腎功能不全之患者，pentoxifylline廓清率降低，可能引起毒性，需減少劑量。
2. 對pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
3. 有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
4. Pentoxifylline和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。FDA Pregnancy Category(懷孕用藥級數)：C。
5. 18歲以下兒童安全性尚未建立。
6. 禁忌：對pentoxifylline或methylxanthines(如caffeine、theophylline、theobromine)過敏者禁用。

【相互作用】

pentoxifylline會延長prothrombin time，增加出血機會。因此使用warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值(包括血紅素、血比容)。

【副作用】

1. 一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀，須作適量的劑量調整)。
2. 皮膚潮紅、心跳加快、胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
3. 少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
4. 本品中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用4-5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。

治療：洗胃並使用活性碳。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。

【賦形劑】

Pentop S.C. Tab. 100mg

Cellulose Microcrystalline(Microcrystalline Cellulose),Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate,Povidone K-30(eq to Polyvinyl Pyrrolidone K30)(PVPK-30)(Povidone K30), Sodium Starch Glycolate,Magnesium Stearate(eq to Stearas Magnesium),Aerosil 200#, Gelatin,Sucrose,Titanium Dioxide(eq to Titanium Oxide),Fast Green FCF(Food Green No.3),Hyromellose 615,Castor Oil(Oleum Ricin)(Ricin Oil)

Pentop S.R. Tab. 400mg

Lactose,PVPK-30,Metolose 90SH-15000,Aerosil 200#,Mag. Stearate

【保存條件】本品應儲存於25℃以下。

【代號、包裝】

藥品名稱	代號	包裝
循妥斯糖衣錠100公絲	POP-0018	6-1000錠/塑膠瓶裝
循妥斯持續性錠400公絲	PET-0186	4-1000錠/塑膠瓶裝、鋁箔盒裝



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511