

“大豐” 尿路消炎鎮痛劑

癒尿寧膜衣錠 100毫克

URODINE F.C. TAB.

100MG " T.F. "

本劑主成分Phenazopyridine HCl其化學名2,6-Diamino-3-phenylazopyridine Hydrochloride是一種Azo色素，為古時代盛行的殺菌劑，後來Sulfa drugs發現後，逐漸為磺胺劑所取代，最近發現它除了可以殺菌消炎外，更可應用於尿路感染時的鎮痛，減輕刺激性。口服後 8~20分鐘，即可移行至尿中，尿路疾患伴隨的尿意頻數、尿意促迫、夜間頻尿、排尿痛等的刺激症狀，可獲得改善。診斷器具使用時粘膜表面之刺傷、疼痛或尿路因異物存在而致之痛苦、灼熱感皆可緩和之。

【主要成分】每錠中含有：

Phenazopyridine Hydrochloride.....100mg

【賦形劑】

Cellactose 80, Corn Starch, Avicel(102), Primojel, Neusilin, Talc, Magnesium Stearate, H.P.M.C, P.E.G.6000, Sunset Yellow FCF(Al-lake), Tartrazine(Al-lake), Erythrosine(Al-lake), Brilliant Blue(Al-lake), Titanium Dioxide。

【適應症】

膀胱炎、腎盂炎、尿道炎、泌尿生殖器粘膜的鎮痛。

【用法用量】

通常成人1次 1~2錠，1天3次飯後服用，服後尿

色呈橘紅色。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

(1)禁忌：(a) 腎機能障礙患者 (b) 尿毒症 (c) 絲球體腎炎 (d) 妊娠時的腎盂炎 (e) 嚴重肝障礙患者 (f) 曾對本劑過敏的患者。

(2)慎重投與：對他種藥物有過敏症患者。

(3)副作用：下述各種副作用呈現時，仔細加以觀察，若確定異常時，則中止投藥。(a) 肝臟：偶爾有肝障害出現 (b) 血液：過量投與或長期投與可能引起 Methemoglobin血症、溶血性貧血 (c) 腎臟：過量投與或長期投與，可能引起腎障害 (d) 神經：偶爾頭痛、眩暈 (e) 消化器：食慾不振、噁心、嘔吐曾經發現過 (f) 過敏症：曾有發疹等過敏症報導。

(4)適用上注意事項：(a) 細菌感染的場合-膀胱炎尿道炎等細菌感染場合，併用化學療法劑 (b) 服用後，尿呈橘紅色，臨床檢查值的影響、衣服的污染等應加注意。

【包裝】6~1000粒塑膠瓶裝

衛署藥製字第 026175 號

PIC/S GMP藥廠



大豐製藥股份有限公司

公司·工廠：彰化縣彰化市延平里岸頭巷11號