

愛特淚 點眼液

Artelac Eye Drops

衛署藥輸字第 020735 號

【成分】

有效成分及含量：每毫升含 Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC 2906) 3.2 mg
其它成分(賦形劑)：Cetrimide, Sorbitol, Disodium phosphate dodecahydrate ,
Sodium dihydrogen phosphate dehydrate, Disodium edetate, Water for injection.
溶液黏度為 7 - 13 mPa.s.

【用途(適應症)】

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 三、其他使用上注意事項：
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 使用前，請洗淨雙手。
 - (四) 請依照藥品標示使用。
 - (五) 以下情形，請勿繼續使用。
 - 1、超過保存期限的眼藥水。
 - 2、開瓶 28 天後。
 - 3、藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (六) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 - (七) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - 1、使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 - 2、使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
 - (八) 配戴隱形眼鏡時，請勿點用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

【用法用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

一天 3 至 4 次	每次 1 至 2 滴。
------------	-------------

【警語】

- 一、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
 - (一) 連續使用三天症狀沒有改善。
 - (二) 使用後產生眼睛劇痛，持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (三) 若有任何不適情況產生。

【包裝】

100 毫升以下瓶裝。

製造廠：Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH
廠址：Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany
藥商：武昌貿易有限公司
地址：台北市南京西路 13 號 8 樓
諮詢專線：(02)25219097