

黃氏

倍康納鼻用噴液

Beclomase Aqueous Nasal Spray "H.S."

【成分】 Each ml contains:

Beclomethasone Dipropionate.....1.11mg

【賦形劑】 Alcohol 95%、Hydroxypropyl Cellulose、
Sodium Dehydroacetate、Purified Water。

【作用】

本品主成分係一種選擇性抗炎類固醇，其作用乃基於局部性抗炎作用，噴於鼻黏膜上被吸收可有效控制鼻炎，在正常劑量使用下，並無全身性之副作用。本品為一種懸浮劑，可替代一般鼻噴霧劑，可使病患免受鼻腔乾燥感。

【適應症】

季節性過敏性鼻炎、常年性過敏性鼻炎。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用

成人：每鼻孔每天一次噴入量，每次噴兩次量（即200 μ g/2dose）或每天兩次每次噴一次量（即100 μ g/dose）。每天最高劑量為10次噴入量。
小孩：按年齡或病況嚴重性，每鼻孔每次噴一次量（即100 μ g/dose），每天一次至兩次。未滿12歲之孩童，每天之最高劑量給予五次噴入量（即500 μ g/天）。

【禁忌症】

1. 無特殊禁忌者，然而肺結核患者應謹慎使用。
2. 妊娠首三個月之孕婦。
3. 對本品產生過敏性之患者。

【副作用】

鼻腔刺激感、噴嚏、罕見鼻出血、鼻咽念珠菌感染。


【注意事項】

1. 本品務須按醫師之指示常規使用才能期獲理想之療效。
2. 本品之療效並非立即性的，使用本品要在幾天後才會顯出完全的療效。
3. 對於那些正在使用全身性類固醇藥物之病患，若欲改用本品，前述藥物仍須為一週內逐次減量與本品使用，以防止住其他過敏性能力疾病之產生。

【包裝】

100毫克以下塑膠瓶裝；25°C以下室溫儲存。

【使用說明】



第一步：使用前請先將本品充分搖勻，取下保護蓋，輕擤鼻子，將鼻孔弄乾淨。

第二步：使用之操作是以拇指壓住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，然後用指力壓下將來內懸液噴出。

第三步：如圖所示將本品之噴口放入一鼻孔中，以食指壓住另一鼻孔，按圖二所示之操作方法用指力壓噴出內懸液之同時緩緩深吸入，然後自口部慢慢呼氣。另一鼻孔照上述步驟使用之。

第四步：用畢後，清洗拭乾噴口，覆加保護蓋，並妥貯存。

PIC/S GMP 藥廠

製造廠： 黃氏製藥股份有限公司
SINCE 1961 雲林縣斗南鎮大同路44巷11號