

倍立克 軟膏

Betasalic Ointment

【性 狀】

倍立克軟膏每公克含0.64毫克Betamethasone dipropionate，相當於0.5毫克(0.05%)Betamethasone和30毫克(3%)Salicylic acid。

【賦形劑】 Mineral oil, White petrolatum

【適應症】

倍立克軟膏的適應症為牛皮癬、慢性異位性皮炎、神經性皮炎(單純苔癬)、扁平苔癬、濕疹、汗皰、頭皮皮脂漏性皮炎、尋常性魚鱗癬等的發炎症狀之解除。

【作 用】

Betamethasone Dipropionate，乃一合成的氟化皮質類固醇，具抗發炎、止癢和血管收縮的作用。倍立克軟膏效果可持續很長,故一日只需使用2次。

【用法用量】 一日2次,早晚薄敷於患處。

【副作用】

灼熱、癢、刺激、乾燥、起泡、多毛、低色素沈著、口周圍皮膚炎、過敏性、接觸性皮炎。如在封閉包裝下，會有以下狀況發生：皮膚浸軟、二次感染、皮膚萎縮、皺摺、起疹、癢。水楊酸可能引起皮膚炎。

【禁忌症】 對本品任一成份有過敏病史者禁用。

【注意事項】

1. 如有刺激或過敏發生則應停用本品。
2. 如有感染發生應給予適當治療。
3. 當封閉包裝或身體大面積使用本產品時，可能有全身性副作用出現，尤其嬰兒及小孩。
4. 全身性副作用為腎上腺抑制。
5. 如有乾燥及刺激感出現，則停用本品。
6. 本品不可眼用。
7. 孕婦使用的安全性尚未建立，故勿讓孕婦大量或長期使用本品。

【過量時出現症狀】

過量長期使用會抑制下視丘－腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。長期過量使用本品會引起柳酸中毒。

【治療方法】

急性皮質類固醇過多乃可逆反應，只需停用本品即可。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。柳酸中毒時只需停用柳酸，再口服碳酸氫鈉來中和尿液並利尿。

【貯 存】 應貯存於25°C以下。

【包 裝】 1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 G-7823 號。
045289

【製造廠】



中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd
廠 址：251新北市淡水區行忠路120號
服務專線：(02) 8631-0018

SCD-079
03