

【成分】每公克含：

Betamethasone valerate.....0.5 mg
(eq. to Betamethasone.....0.42 mg)
Lidocaine HCl.....25 mg
Phenylephrine HCl.....1 mg

【適應症】外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍、肛門裂創。

【作用】依文獻記載

- Betamethasone之抗炎症及抗過敏作用為cortisone之40-50倍，prednisolone之8-10倍，又其用量比dexamethasone少即可發揮其功效。Betamethasone valerate為其專使用於外用、局部用之衍生物、除了具有抗炎症及抗過敏作用外，同時也是所有corticosteroids中唯一具有消除外痔核之藥物。（日本最近新藥29集P. 48藥效再評價第11-13次判定結果）
 - Lidocaine HCl 具表面麻醉作用，可輕緩外痔疼痛及肛門搔癢症。
 - Phenylephrine HCl 具末梢血管收縮作用可以抑制痔出血。
- 三種藥物合理地配合，使本藥具有消炎、止痛、止癢、止血及消除痔核等作用。

【用法用量】通常1天2-3次，將患部洗淨後，以適量直接塗布於患部，本藥可使用於直腸內。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】一、本藥限於皮膚外用不得內服，不得使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。

二、塗抹皮膚外用藥後如需配戴隱形眼鏡，應先徹底洗淨雙手，再為之。

【賦形劑】Tefose 63、Myristyl Myristate、Octyldodecyl Myristate、Eutanol G、Dimethicone (DC 200/100)、Propylparaben、Methylparaben、Aloe、Purified Water。

【儲存】於25℃以下，避開熱源儲存。

藥品應置於小孩不易取得處。在保存期限內使用。

【包裝】1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司

南投市南崗工業區南崗三路272號 MADE IN TAIWAN

☎ 049-2253190

服務時間8:00~17:00 (例假日除外)
網址<http://www.yuanchou.com.tw>