

衛署藥製字第 026308 號
Code No. 31209

“溫士頓”

康 膚

乳 膏

(達淨磺胺銀) 10 公絲/公克

"Winston"

Canflame

(Silver Sulfadiazine)

Cream
10 mg/gm

【成分】

“溫士頓”康膚乳膏是一種柔軟的白霜劑，每 Gm 含超微粉的

Silver Sulfadiazine.....10 mg

賦形劑：Liquid Paraffin、Isopropyl Myristate、Cetyl Alcohol、Stearyl Alcohol
、Glyceryl Monostearate、Tween 20、Propylene Glycol、Purified
Water

【作用及特長】

“溫士頓”康膚乳膏，很容易塗抹於燒傷的皮膚上，且很容易以水洗去。超微粉之 Silver Sulfadiazine 是一種抗菌劑，其作用機序是作用在菌體的細胞膜及細胞壁以達到殺菌效果，本品具有很廣的抗菌力，它對其他抗菌劑有抗藥性的菌種，仍有抑制功效。在試管中 100 mcg/ml 超微粉之 Silver Sulfadiazine 對下列菌種有百分之百的殺菌效果。麥氏假單胞菌 (*Pseudomonas maltophilia*)，綠膿桿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)，克雷白氏菌種 (*Klebsiella*)，大腸桿菌 (*Escherichia coli*)，大腸菌屬 (*Enterobacter Sp.*)，奇異變形菌 (*Proteus mirabilis*)，瑞氏變形菌 (*Proteus rettgeri*)，普通變形菌 (*Proteus vulgaris*)，沙雷氏菌屬 (*Serratia*)，摩干氏變形菌 (*Proteus morgani*)，普洛維頓斯菌屬 (*Providencia*)，迷瑪桿菌屬 (*Mima*)，海瑞里桿菌屬 (*Herellea*)，檸檬酸桿菌屬 (*Citrobacter*)，白喉桿菌 (*Corynebacterium diphtheriae*)，金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)，表皮葡萄球菌 (*Staphylococcus epidermidis*)，乙種溶血性鏈球菌 (β -hemolytic streptococcus)，腸球菌 (丁組鏈球菌) *Enterococcus* (group D streptococcus)，產氣莢膜梭菌 (*Clostridium perfringens*)，白色念珠菌 (*Candida albicans*)。Silver Sulfadiazine 的傷口滲出物接觸後，會漸漸被代謝。約有 10% 的 Sulfadiazine 被吸收，而被吸收的 Silver 僅在 1% 以下，因本品 Silver Sulfadiazine 之化學結構上不屬於 Carbonicanhydrase inhibitor，所以在使用本品時不會產生酸中毒的副作用且敷藥時不覺疼痛，因此特別適合小兒科使用。

【適應症】預防及治療因燒傷引起的感染。

【用法用量】

1. 燒傷的傷口一定要清洗乾淨，剪去多餘的皮膚後，手戴無菌手套，或以滅菌之藥刀敷上。傷口必須隨時敷著康膚乳膏，每天一至二次，厚度可達 3~5 mm，若因行動不小心而抹掉，應馬上再行敷上。
2. 傷口必須繼續用藥直到有令人滿意的癒合結果或是傷口預備行皮膚移植時止，也就是說只要傷口有被感染的機會存在時，就應該繼續用藥，除非有顯著的副作用發生。
3. 一軟管或一罐“溫士頓”康膚乳膏應該只使用於一位患者，當治療痊癒後，剩餘的乳膏即應丟棄不用。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 對 Silver Sulfadiazine 曾有過敏反應者應小心使用，如發生過敏反應，則須考慮停用 Silver Sulfadiazine。
2. 體內缺乏 Glucose-6-phosphate dehydrogenase 的患者，使用本品，可能會造成溶血。
3. 孕婦使用本劑的安全性尚未確立，所以哺育之婦女，除非燒傷達全身總面積 20% 以上，或使用本品需求高於對胎兒可能造成的危險性時，方可使用本劑。
4. 使用本品治療廣泛面積的皮膚燒傷時，血清中硫含量可能達到成人的治療劑量 (8~12 mg%)，因此這些患者應驗血以測知血清中硫的含量，腎功能及尿中有無硫結石也應注意。
5. 若腎功能或肝功能不健全，本劑的排泄率降低，可能在體內造成積蓄作用，此時應考慮停藥。
6. 本品與局部蛋白分解酵素合用時，應考慮 Silver 可能使些酵素失效。
7. Sulfonamide 會增加患者產生核質性黃疸 (Kernicterus) 所以 Silver Sulfadiazine 不可使用於即將分娩的孕婦，早產兒或未滿月的嬰兒。

【副作用】

1. 以 2297 個病患使用 Silver Sulfadiazine 只有 59 病例 (2.5%) 發生副作用，其中 5 例有灼熱感，2 例皮膚癢，1 例間質性腎炎，但只有 0.9% 須停藥。
2. 因部份的 Silver Sulfadiazine 會經傷口吸收，所以有關服用 Sulfonamide 所發生的副作用，使用 Silver Sulfadiazine 時亦可能發生。

【包裝】

1000 公克以下塑膠瓶裝、積層管裝及塑膠軟管裝。

1802-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街 117 號