



“杏輝”

G.M.P. 藥品

# 可立舒 軟膏 0.5毫克/公克(可洛貝他素)

## CLOBETASOL Ointment 0.5mg/gm “Sinphar”

Clobetasol propionate 為高效性腎上腺皮質醇劑，對皮膚疾患其他類固醇製劑無效時，本劑有令人滿意的療效。

成 分：每gm含有

Clobetasol propionate.....0.5mg

賦形劑：Liquid petrolatum、White petrolatum、Propylene glycol、Beeswax

特 性：1.本劑對於治療濕疹、乾癬之效果較其他類固醇製劑為佳，對於使用Betamethasone Valerate, Fluoclorolone及Fluocinonide無效之症狀使用本劑有令人滿意的療效。

2.本劑之基劑呈微透明之油膏狀，對於濕疹及乾癬之治療藥效快，尤以對頑固、硬化、有鱗片或乾裂之苔癬應使用油膏來治療。

適 應 症：濕疹、皮膚炎(指掌角皮症、苔癬、日光皮膚炎)癢疹、掌蹠膿疱症、乾癬。

用法用量：1日1~2次患處塗敷。

### 注意事項：

- 1.濕疹或皮膚炎患者，應注意若有皮膚感染伴隨時應配以抗菌劑或抗真菌劑來治療。
- 2.當需要較長期之治療時與其他局部類固醇製劑一樣在病情未加檢討前，其使用期不要超過四週。
- 3.用於臉部及頸部治療時，僅能作短時性使用，以免皮膚呈現萎縮現象。
- 4.具有皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹，或對本劑有過敏性之患者，應禁止使用。
- 5.長期使用本劑，若有過敏性之皮膚症狀發生應即停止使用本劑，若有皮膚感染性症狀時，再配以抗菌劑或抗真菌使用時，若未見改善，則宜暫停本劑，俟感染之皮膚，獲得控制後再行敷用。
- 6.若有腦下垂體，腎上腺之壓制作用時，短時停藥後，即可恢復正常。
- 7.妊娠期，不可廣泛使用本劑。
- 8.嬰兒及小兒應避免長期使用本劑，以免發生其副腎之壓抑作用。
- 9.眼臉皮膚使用時，應注意不要大量且長期使用，以免引起眼壓亢進。
- 10.使用類固醇治療乾癬，偶有膿疱症及紅皮症現象，通常本劑之耐量良好，但發生時，應立即停藥。

儲存：室溫(15~30℃)下保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第028562號

G-0292號

包 裝：1000公克以下鋁管軟管裝、塑膠罐裝



G.M.P.

® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號

84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)021053、015151

web site: http://www.sinphar.com