

乙類成藥

口樂 漱口水 0.12%
Corol Oral Rinse Solution 0.12%

【成分】

有效成分及含量：Each mL Contains：

Chlorhexidine Gluconate 20%.....6mg

(as equivalent to Chlorhexidine Gluconate.....1.2mg)

其他成分(賦形劑)：Glycerin, Propylene Glycol, Cyclamate Sodium, Sodium Saccharin, Sorbitol Solution 70%、PEG-40 Hydrogenated Castor Oil、Alcohol 95%、Blue No.1、Peppermint Oil、Sodium Hydroxide、Water Purified。

【用途(適應症)】

口腔內之殺菌、消毒、清潔、去除口臭。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 未滿 6 歲。
3. 口腔潰瘍的人。

二、其他使用上注意事項

1. 本藥僅供漱洗不可吞服。
2. 為防止兒童誤食請妥善保管。
3. 避免陽光直射。
4. 6 歲以上 12 歲以下兒童需在大人指導下使用。
5. 本藥含酒精 2.85%，宜審慎使用。
6. 使用後 30 分鐘內請勿進食、吸煙或服用飲料。

【用法用量】

用法	用量
漱口水劑於口腔內漱洗並停留 30 秒至 60 秒後吐出，可於早晚或需要時使用。	每次 10ml

【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
口腔及喉部	灼熱感及刺痛感

二、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.如不慎過量使用及吞服後，感覺不適的人。

【包裝】

10 毫升塑膠瓶裝、500 毫升以下、4000 毫升塑膠瓶裝。

【藥物動力學】

使用 Chlorhexidine Gluconate 0.12%漱口水時，會有 30%的有效成分慢慢的釋出於漱口液中，而作用於口腔粘膜。

由人和動物的研究：Chlorhexidine Gluconate 在胃腸道的吸收不好，若不慎服用，於 12 小時後約有 90%的有效成分會從糞便中排出。

【貯存】

1. 請勿變換容器，避免誤服。
2. 室溫 25°C 以下。

衛部成製字第 016842 號

【包裝及其製造廠】

10 毫升塑膠瓶裝。

公 司：麥迪森醫藥股份有限公司
台北市中正區林森南路 10
號 5 樓

製 造 廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
桃園市桃園區桃鶯路 445-2 號 1 樓

【包裝及其製造廠】

500 毫升以下、4000 毫升塑膠瓶裝。
(除 10 毫升以外)

委 託 者：麥迪森醫藥股份有限公司
台北市中正區林森南路 10
號 5 樓

製 造 廠：榮民製藥股份有限公司
桃園市中壢區中山東路三段 447 號