

# “元宙”黛安膚乳膏

## Dance cream “Y.C.”

衛署藥製字第 G-8099 045825 號

〔成份〕 Each gm contains :

Mometasone Furoate ----- 1 mg

〔作用〕: Mometasone Furoate 為一種合成的類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

〔適應症〕: 對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

〔用法用量〕: 一日一次，薄敷於患處，直到患處痊癒，最久持續敷藥至三星期為止。

〔副作用〕: 感覺異常，癢或皮膚萎縮，但極少發生。使用其他局部類固醇製劑可能會有的局部副作用：刺激性、多毛症、色素沈著不全、口周皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎、皮膚浸軟、二次感染、皸摺及汗疹。

〔禁忌症〕: 禁用於對本劑中之任一成份或其它類固醇過敏之病人。

〔注意事項〕: 如有刺激、過敏發生、應停用本劑，並施予適當治療。如患處有明顯的感染發生，應予適當抗生素和抗黴菌劑治療，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染被控制住方可再用。其他如全身性類固醇易引起的副作用偶爾也會發生，如腎上腺抑制。廣體、密閉式治療容易引起全身性吸收。所以在長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。本劑不可作為眼用。大面積、密閉式治療容易增加全身性吸收。所以在在大面積或長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。兒童使用局部類固醇較成人病患更易導致下視丘-腦下垂體軸功能抑制及 Cushing's syndrome，因為體表面積/體重的比例較大。兒童局部使用類固醇必須將劑量限制在可達有效治療的最低使用量，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長發育。

〔懷孕或哺乳婦女〕: 對胎兒及哺乳婦女安全性未知，因此在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用，請務必小心，不得大量或長期使用。局部使用類固醇而全身性吸收，尚不知是否會分泌在乳汁中，全身性的使用類固醇會分泌於乳汁中，要估計此藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

〔過量〕 出現症狀：過量長期使用會抑制下視丘-腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。

治療方法：可給予適當的症狀療法。急性皮質類固醇過多乃可逆反應。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。如果為慢性中毒，以漸進式中止類固醇治療。

〔包裝〕 1000 公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

儲存於 25°C 以下。

本藥須由醫師處方使用。

元宙化學製藥股份有限公司

南投市南崗工業區南崗三路 272 號

TEL : (049) 2253190