



"永勝"

得膚寧乳膏0.05%

(可洛貝他索丙酸)

Defulin cream 0.05%

(Clobetasol Propionate) "EVEREST"

【成分】：每公克內含：

Clobetasol Propionate.....0.5mg

【適應症】：

牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑狼瘡。

【用法・用量】：

每日一或兩次薄塗於患處，直至症狀改善為止，與其他高效外用類固醇製劑的情形一樣。當症狀得到控制時即應停用。本劑數天即可見效，如需較長療程則建議治療時間不應持續超過四星期。本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】：

酒渣鼻、暗瘡和口周皮炎。

由病毒（例如水痘）、真菌（如念珠菌病、癬）或細菌（如膿疱病）引起的感染對此製劑過敏者。

【注意事項】：

- (1) 應儘可能避免以本劑進行長期的連續治療，尤以嬰兒及兒童為然。
- (2) 如兒童須用本劑，則建議每週需加以複查，還須強調指出，嬰兒的尿布可能有封閉性敷料的作用。
- (3) 在長期塗用皮質類固醇後，面部會較身體其他部位更易產生萎縮變化。當面部疾患確證可用本劑治療時尤應注意此點，而且經常觀察患者情況亦甚重要，如塗用於眼瞼，必須注意勿使藥膏進入眼內因可能引起青光眼。

- (4) 在治療已受感染的發炎皮膚損害時，應使用適當的抗菌劑，當發現感染擴散時，需停止外用皮質類固醇療法，並給予適當的系統化學治療，細菌感染可因封閉敷料的溫暖而潮濕的條件而加劇，而在換用新敷料之前應將患處清洗乾淨。
- (5) 外用類固醇不應多用於孕婦，亦即不大量地或長期地使用。

【副作用】：

- (1) 如果成人的每週劑量不超過50克，則一俟短療程的類固醇療法停止，短暫的垂體－腎上腺抑制情況就會很快地恢復正常，此點亦適用於按成人劑量比例用藥的兒童患者。
- (2) 採用封閉敷料可增強外用皮質類固醇的吸收。
- (3) 採用高效用的皮質類固醇製劑進行長期和深切的治療時，可引起萎縮變化，例如皺紋、皮膚變薄血管表面擴張，尤其是當使用封閉敷料或有皮膚皺摺處為然。
- (4) 患者對本劑通常具有很好的耐受性，但若出現過敏徵象時，則應立即停用。
- (5) 藥物注意事項貯於30℃以下。

【進一步說明】：

應選用能控制病患而效力不致過大的皮質類固醇。本劑不含羊毛脂。

【賦形劑】：

Cetyl Alcohol、Mineral Oil、Isopropyl Myristate、Cream Base Wax、Polyoxyethylene(25) Cetyl Ether、Glyceryl Monostearate、Methyl Paraben、Menthol、Purified Water。

【包裝】：

1000公克以下管裝、瓶裝。

衛署藥製字第037096號



永勝藥品工業股份有限公司
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)