

# 寶膚寧乳膏

## Dermalin Cream

❖ 成分：Each Gm Contains:

Betamethasone Dipropionate..... 0.64mg  
(eq.to Betamethasone)..... 0.5mg  
Clotrimazole.....10.00mg

賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate, Cream Base Wax,  
Polyoxyethylene(25)Cetyl Ether, Glyceryl Monostearate, Methyl  
Paraben, Peppermint Oil, Purified Water.

❖ 作用：本品為一均勻、潤滑而不油膩之乳膏，呈白色至乳白色。

本品結合Corticosteroid及廣效抗黴菌劑。

Betamethasone Dipropionate：具有持續性抗發炎、止癢及抗過敏的作用。

Clotrimazole：對各種致病之皮膚黴菌、酵母菌屬有顯著效果。其作用於真菌的細胞膜，而導致內含物的外流，主要是破壞和抑制黴菌的分裂及增殖。

❖ 適應症：適用於下列皮膚感染的局部治療：由紅色毛癬菌（Trichophyton rebrum）、鬚瘡毛癬菌（Trichophyton mentagrophytes）、絮狀表皮癬菌（Epidermophyton floccosum）、大小芽孢菌（Microsporum canis）所引起之足癬、股癬、頭癬。

❖ 用法用量：本藥須由醫師處方使用。

在感染部位局部塗佈本品，予以溫和的搓揉。每日早晚各一次，對

頭癬、股癬和念珠菌症需連續治療二個星期，而足癬則為四個星期。

臨床症狀的改善，以紅腫和癢而言，通常在治療後三到五天開始消失。

對罹患體癬和股癬之患者，在使用本品一週後症狀仍無改善，或是對足癬患者給予二星期治療後症狀仍無改善的話，則病人必須再診斷一次。

❖ 儲藏：請儲存於30°C以下。

❖ 注意事項：

1. 副作用：使用本品偶爾會發生下列反應：感覺異常，斑丘疹，水腫，次發性感染。

以下為使用局部類固醇會發生的不良反應：灼燒感、癢、刺激感、乾燥、起泡、多毛症、痤瘡疹、色素不足、口周發炎、過敏性接觸皮膚炎、軟疹、次發性感染、皮膚萎縮、粟丘疹和分層；至於對Clotrimazole則包括皮膚上的刺痛、水泡、脫皮、水腫、蕁麻疹和刺激感。

2. 禁忌症：對本品或其他類固醇或Imidazoles有過敏反應發生者禁用。

3. 注意事項：a. 本品不得使用於密閉塗敷。

b. 使用本品時，如發生刺激感或過敏反應，應立即停止使用。

c. 有細菌感染時，應同時配合適當的抗生素使用，若情況不能迅速改善，則應停用本品，直到細菌感染確實控制為止。

d. 任何全身性類固醇作用，包括腎上腺抑制，可能會發生在嬰兒或孩童身上，尤其是大面積的治療，或長期使用者，特別會加速這種情形的發生。

e. 本品對12歲以下孩童之安全性尚未建立。

f. 本品不得使用於眼部。

g. 本品對胎兒及哺乳婦女的安全性未知，因此在必須使用情況下，請務必小心，不得大量或長期使用。

❖ 包裝：1000公克以下罐裝及軟管裝。

衛署藥製字第037162號G-3975

委託者

意欣國際有限公司

高雄市三民區懷安街119號 TEL：07-3863323

製造廠：PIC/S GMP藥廠

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路128號 TEL：05-2360636