

複合維生素 B2 眼用藥
"派頓"眼晶[®]眼藥水
ENGENE Eye Drops" Patron"

「眼睛是靈魂之窗」，眼睛對於我們人體之重要性是一件眾所皆知之事，幾乎人人都希望自己擁有一雙亮晶晶的眼睛，但是眼睛也是我們人體中最敏感的器官之一，所謂「眼裡容不下一粒細沙」是也，因此平時我們對於自己眼睛之衛生、保護及保養更應加以特別的重視，眼睛稍有不適之感覺或灰塵等異物進入眼裡時，即應適時地以適當之眼用藥劑加以處理或治療。

【成分】每 ml 中含有：

有效成分及含量：Sodium Flavin Adeine Dinucleotide 0.5mg, Chlorpheniramine Maleate 0.2mg,
Pyridoxine Hcl 1.0mg, Taurine 5.0mg, Dipotassium Glycyrrhizinate 0.5mg.

其他成分(賦形劑)：Sodium Borate(Borax), Boric Acid, Benzalkonium Chloride, Sodium Chloride, E.D.T.A.
Disodium, Purified Water.

【用途(適應症)】：眼睛疲勞、眼睛癢，暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適。

【使用上注意事項】

- (一)有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二)有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- (三)有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
青光眼的人。

(四)其他使用上注意事項：

- 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2. 避免陽光直射。
- 3. 使用前，請洗淨雙手。
- 4. 請依照藥品標示使用。
- 5. 以下情形，請勿繼續使用：
 - 1、超過保存期限的眼藥水。
 - 2、開瓶 28 天後。
 - 3、藥液混濁、變色或出現異物時。
- 6. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- 7. 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - 1、使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 - 2、使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
- 8. 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

【用法用量】：一天 3 至 6 次，每次 1 至 2 滴點眼。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1. 連續使用三天症狀沒有改善。
- 2. 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- 3. 若有任何不適情況產生。

【包裝】：100 公撮以下塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】：儲存於 25°C 以下。



臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號 TEL：07-6216126