

請由此處剪開



↑ 開封後請速將拉鍊密閉

# 德山 菲比藥膠布

水性藥膠布

# 外

無臭性

## FLURBI PAP "D.S."

4枚入

# 用

(1枚14cm X 10cm)



肌肉酸痛

腰痛

運動傷害

肩痛

關節炎



水性貼布·清涼透氣  
撕貼容易  
能滲入皮膚組織及關節患部  
可促進血液循環  
鎮痛消腫藥效溫和



德山製藥股份有限公司

DERSAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

請由此處剪開



開封後請速將拉繩密閉

# 德山 菲比藥膠布

## FLURBI PAP "D.S."

無臭性

4枚入

(1枚14cm X 10cm)

# 外用

本品為一水性貼布清涼透氣、撕貼容易，能滲入皮膚組織及關節患部，可促進血液循環，鎮痛消腫，藥效溫和。對於關節炎、肩、腰、腿部肌肉酸痛及運動傷害之發炎紅腫，均有良好的療效。

**適應症：**變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、肌肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

**成分：**每片10g實體(14cm×10cm 不含不織布、離形紙)含：Flurbiprofen 40mg

**賦形劑：**Purified Water, Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol, L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquileate, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution 70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620

**用法用量：**1. 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼2~3次，可切割成適當大小，剝去表面導紙，貼於患部。2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。  
3. 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。

【本藥須由醫師處方使用】

### 注意事項：

1. 請勿使用於下列部位：(1)眼睛四周，粘膜處。(2)濕疹、癢疹、傷口等部位。
2. 對藥物化粧品等有過敏症狀者(例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹等)使用前需請教醫師或藥師。
3. 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
4. 本品應置於兒童不易拿到之處。
5. 避免日光直射，貯存於乾燥陰涼處。
6. 使用後將開封鍊條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。
7. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

製造批號：

保存期限：

製造廠：



德山製藥股份有限公司  
DERSAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
嘉義縣民權工業區中山路38號  
服務專線：0800-775589

衛署藥製字第043493號