

105x176mm

護康視 懸濁點眼液 0.02%
FLUCASON Ophthalmic Suspension 0.02%
(Fluorometholone)

【成分名】

Fluorometholone

【劑型、含量】

懸濁點眼液：每mL含 Fluorometholone (0.2 mg)

【適應症】

眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。
使用時充分搖晃均勻，一次1～2 滴，一日點眼2～4次。
視年齡、症狀可適當增減。

【藥物動力學】

眼內分布（參考：家兔）：
將標識0.1% Fluorometholone懸濁液25μL 點眼家兔，5分鐘後角膜的眼組織濃度，房水則45分鐘後分別呈現1.99μg/g、0.16μg/g之最高值。點眼30分鐘後各組織之濃度，角膜為1.544μg/g、球結膜為0.738μg/g、虹膜為0.320μg/g、鞏膜為0.178μg/g、房水為0.154μg/g。此外，Fluorometholone 之眼組織，其消失速度比 dexamethasone及醋酸prednisolone要快。

【臨床效果】

本劑使用於外眼部疾患（眼瞼炎、過敏性結膜炎、水泡性結膜炎、春季角結膜炎、流行性角結膜炎、表層角膜炎、角膜疱疹、鞏膜炎等）80例，前眼部疾患（虹膜炎、虹膜睫狀體炎、葡萄膜炎等）25例及術後炎症（白內障、青光眼、網膜剝離，斜視矯正等之手術）46例，其臨床效果如下表。

臨床效果%（病例數）				
	非常有效	有效	稍微有效	不明或無效
外眼部疾病	7.5% (6)	48.8% (39)	20.0% (16)	23.7% (19)
前眼部疾病	4.0% (1)	36.0% (9)	20.0% (5)	40.0% (10)
術後炎症	—	30.4% (14)	52.2% (24)	17.4% (8)

【藥理作用】

抗炎症作用（家兔）：
Fluorometholone 點眼液用於家兔的ferritin或用於牛的血清蛋白之實驗性葡萄膜炎中，結果獲得與同濃度的dexamethasone點眼液相同的炎症抑制效果。

【禁忌】

對Fluorometholone有過敏之既往病史之患者。
[原則禁忌 (原則上對下列病患不可投與，但有必要時應慎重投與)]。
1)角膜上皮剝離或角膜潰瘍之病患（此類疾病可能惡化。或可能發生角膜穿孔。）
2)病毒性結膜、角膜疾患，結核性眼疾患，真菌性眼疾患或化膿性眼疾患之病患 (此類疾病可能惡化。或可能發生角膜穿孔。)

【注意事項】

1.副作用

至承認時前的調查及副作用調查之總病例7,276例中，呈現副作用有3例（0.04%）。其中眼壓上升2件(0.03%)，過敏性結膜炎之惡化1件(0.01%)。（副作用調查時）

1)重大副作用（偶爾：小於0.1%，有時：介於0.1～5%，除以上情況：5% 以上或頻度不明）

眼

- (1)青光眼：因連續使用偶爾會在幾個禮拜後眼內壓上升出現青光眼，因此須定期作眼內壓檢查。
(2)角膜疱疹，角膜真菌症，綠膿菌感染症：有可能誘發角膜疱疹，角膜真菌症，綠膿菌感染症等症狀。此時，應採取適當處置。
(3)穿孔：在有角膜疱疹，角膜潰瘍或外傷等情況下，投與本劑有可能發生穿孔。
(4)後囊下白內障：因長期投與，有可能發生後囊下白內障之虞。

2)其他副作用

發現副作用時，應停止用藥，採取適當處置。

種類 \ 頻度	頻度不明
過敏症	眼瞼炎
眼	刺激感、結膜充血
下垂體、副腎上腺皮質系統機能(長期連續使用時)	下垂體、副腎上腺皮質機能之抑制
其他	創傷治癒之延遲

2.高齡者之用藥

通常，高齡者之生理機能會下降，因此要注意。

3.孕婦、產婦、哺乳產婦等之用藥

孕婦或可能懷孕之婦女應避免長期、頻繁用藥。（懷孕中之用藥，尚未確立其安全性。）

4.幼兒之用藥

特別是2歲以下幼兒，須慎重用藥。（尚未確立嬰兒、幼兒之安全性）

5.應用上之注意

- 1)投與途徑：僅用於點眼。
2)投與時：為防止藥液受污染，指導病患在點眼時，注意勿將容器的瓶口直接接觸眼睛。

【賦形劑】

Boric Acid、Sodium Borate、Sodium Perborate、H.P.M.C. 615、Tween 80、Dist. Water。

【貯存】

25℃以下存放。

【包裝】

100公撮以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第 046103 號
G-8216

商：健喬信元醫藥生技股份有限公司
新竹縣湖口鄉工業一路6號

委託製造廠：景德製藥股份有限公司 桃園廠
桃園市蘆竹區長安路一段80號、148號2樓至7樓

4211D