

本品具有收縮血管、防腐、收斂、止痛及滑潤、緩和之綜合作用，對內痔外痔均有良好之治療作用。

【成份】: Each gm contains:
Bismuth oxychloride-----40.0mg
Adrenaline-----1.0mg
Benzocaine-----25.0mg
Vitamin A concentrate-----7.5mg
(=7,500 Vitamin A units)
Zinc oxide-----50.0mg

【賦形劑】: Each gm contains:
LANOLIN ANHYDROUS (WOOL FAT)-----120mg
WHITE SOFT PARAFFIN (WHITE PETROLATUM)
(PARAFFIN WHITE SOFT)-----755.5mg
MENTHOL L-----1mg

【適應症】: 內外痔

【用法用量】: 適量塗於患處。(外用)

醫師藥師藥劑生指示藥品。

外痔：在排便前後應用冷水洗淨患處，並於早晨及睡覺時使用本品少許於患處。

內痔：在排便前後，將管子接於敷藥器上，插入直腸內，輕壓管子，使本品少許敷於肛門直腸區內。

【主 意 事 項】:

1. 應嚴守用法、用量。
2. 連續使用兩週，或有過敏現象，請勿用。
3. 如遇有下列情形，應即請教醫師。
 - (1) 經數次使用後病況未見好轉時。
 - (2) 孕婦或有懷孕徵候之婦人。
 - (3) 使用於兒童時。
4. 本樣品含 Benzocaine 成分，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症 (methemoglobinemia) 之不良反應。若在用藥後(通常於2小時內)發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性紅血素血症之症狀，請立刻停止用藥，並且諮詢醫師。
5. 本藥品勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。
6. 對 benzocaine 成分藥品過敏之病人請勿使用。
7. 本藥品應小心謹慎用於兒童。
8. 民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品。
9. 除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒，成人亦應遵循仿單(藥品說明書)相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應立即就醫。

【包裝】: 1000公克以下塑膠瓶裝、鋁管裝。
儲存於25°C 以下。

委託者: 衛化企業有限公司
高雄市仁武區灣內里赤南巷 62 號

TEL: (07)3612386

製造廠: 臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路50號