

“濟時”

# 利口炎<sup>®</sup> 口內膏 (安西諾隆)

## LECORT in ORAL BASE (Triamcinolone)

本劑因含消炎劑-triamcinolone acetonide，故能抑制炎症之發生。本劑對於口腔內之炎症疾患有療效，故為口腔黏膜之治療劑。

【成分】 Each gm contains:

Triamcinolone acetonide ..... 1mg

【賦形劑】 Propyl Paraben、Methyl Paraben、Polyethylene Oxide、Carbopol 940、Sodium Hydroxide、Purified Water

【藥理作用】

Triamcinolone acetonide 是一種合成的類固醇激素，故能治療口腔內之炎症及潰瘍。

【適應症】

齒肉、口腔黏膜、舌頭之發炎或潰瘍、口角炎、齒樁膿漏、假牙刺激所引起之疾患。

【用法用量】

通常每日一次，睡前適量塗布患處，如果症狀嚴重時可增加至2~3次，但最好於飯後塗之，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 禁忌：口腔有結核性、病毒性或化膿性感染症者，對本劑有過敏症之病歷者。
2. 副作用：若有真菌或細菌性感染時，須同時併用適當的抗菌劑，若有過敏發生請停用。長期使用有可能抑制腦下垂體及副腎皮質的功能，有時塗擦後有輕度的不適感或味覺的減退或變化。孕婦請避免長期使用。乳兒及小兒避免長期連用。
3. 使用後暫時不要飲食，不可使用於眼睛。

【儲存條件】請儲存於25°C以下。

【包裝】6公克、1000公克以下鋁管裝。

委託製造者：

濟時藥品股份有限公司

台南市中西區民權路二段158號4樓

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路182號

