

洛黴欣 乳膏 2%
(Lomexin Cream 2%)

衛署藥輸字第
020022號

洛黴欣 外用噴霧劑 2%
(Lomexin)

衛署藥輸字第
020042號

洛黴欣 陰道軟膠囊
(Lomexin)

衛署藥輸字第
020053號

成分：

乳 膏：每公克含Fenticonazole Nitrate.....20 mg

外用噴霧劑：每毫升含Fenticonazole Nitrate.....20 mg

陰道軟膠囊：每粒 含Fenticonazole Nitrate.....200 mg

特性：

Lomexin為廣效的抗黴菌藥物，用於皮膚科及婦科，主成分為fenticonazole, [1(2,4-dichlorophenyl)-2-(N-imidazolyl)ethyl-4-phenylthiohenzyl ether nitrate]，本品為imidazole衍生物，由Recordati所合成。

Lomexin具有殺菌及抑制黴菌之效用，作用於表皮癬菌屬、致病酵母菌、dimorphous fungi及絲菌上。

Lomexin對於下列菌種有效：Tricophyton mentagrophytes, T. verrucosum, T. rubrum, T. tonsurans, T. terrestre, Microsporum canis, M. gypseum, M. audouinii, M. fulvum, M. cookie; Epidermophyton floccosum; candida albicans; Criptococcus neoformans; Geotrichum candidum; Torulopsis glabrata; Sporotricum schenckii; Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus; Penicillium crysogenum。

適應症：

皮黴菌病(Dermatomycosis)：導因於皮黴菌感染；包括髮癬菌屬(Trichophyton)，小芽胞癬菌屬(Microsporum)，以及表皮癬菌屬(Epidermophyton)；因感染部位不同可分為：禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、tinea manuum、tinea faciei、髮癬、甲癬等。

皮膚念珠菌病：常見的有肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部念珠菌病、“napkin”、會陰及陰囊念珠菌病、生殖器念珠菌病(女陰與陰道炎、月經感染、陰莖頭炎、陰莖頭包皮皮炎)、甲床炎及甲溝炎。

用法用量：

每日一至二次，在清洗擦乾後，將Lomexin塗抹在患部。

- 乳膏最好用在乾燥的黴菌病上：如花斑癬、紅癬、甲黴菌病(用在甲黴菌病上，乳膏需以閉合方式塗抹)，乳膏亦適合用在男性生殖器的黴菌病。

- 噴霧劑適用於大面積及長有體毛的皮膚，且對於不易塗抹的蔓延菌病區域使用方便。

- 陰道軟膠囊：每日一次睡前使用200毫克陰道軟膠囊一粒。

在皮膚黴菌感染上使用Lomexin，應規律使用，直到疾病痊癒(平均2~3星期)；在陰道感染方面，臨床上顯示3~6天即可治療痊癒，然而，適當的延長治療，可避免再度感染。

Lomexin不油、不髒，且易用水洗淨。

副作用：

Lomexin在皮膚及黏膜上有很好的耐受力，僅有輕微瞬間紅斑性反應，局部使用於傷口或陰道給藥有輕微的灼熱感，然很快會消失，如有持續性刺激反應，並擴散到其他器官，應立刻停藥，並向醫師求診。

禁忌：

已知對本品有過敏者不可使用。

警語：

局部使用於開放性傷口，或在陰道內用藥後，會產生輕微短暫的灼熱感，但若長期局部使用會有過敏現象。懷孕婦女使用Lomexim的資料有限；謹慎起見，懷孕期間須在醫師評估潛在利益大於對胎兒風險的情況下使用。

包裝：

乳膏：100公克以下軟管裝。

外用噴霧劑：100毫升以下瓶裝。

陰道軟膠囊：2-1000粒盒裝。

有效期限：3年

儲存溫度：儲存於25°C以下

本品應置於孩童伸手不及處，且不可使用於眼睛。

本藥須由醫師處方使用

賦形劑：

洛黴欣乳膏 2%

Propylene Glycol, Hydrogenated Lanolin, Almond Oil, Polyglycolic Ester of Fatty Acids, Cetyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Sodium Edetate, Purified Water

洛黴欣外用噴霧劑 2%

Alcohol, Propylene Glycol, Purified Water

洛黴欣陰道軟膠囊

Sodium Ethyl Hydroxybenzoate, Sodium Propyl Hydroxybenzoate, Triglycerides of Saturated Fatty Acids, Colloidal Silicon Dioxide, Gelatin, Glycerin, Titanium Dioxide

洛黴欣乳膏 2%

洛黴欣外用噴霧劑 2%

製造廠：Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.P.A.

地址：Via Civitali, 1-20148 Milano Italy

洛黴欣陰道軟膠囊

製造廠：Catalent Italy S.p.A.

地址：Via Nettunense Km 20, 100-04011 Aprilia (LT), Italy

藥商：健喬信元醫藥生技股份有限公司

地址：新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號