

# 美康 乳膏

## MYCOMB Cream “Sinphar”

—— 綜合性皮膚疾患治療劑 ——

組成：每gm含有

Nystatin.....	100,000 units
Neomycin (as sulfate)....	2.5 mg(potency)
Gramicidin.....	0.25 mg
Triamcinolone acetonide.....	1.0 mg

作用特點：

- (1)本軟膏具有抗炎、止癢、殺菌和殺黴菌之四種不同藥理作用。
- (2)Triamcinolone Acetonide：為強力之賀爾蒙，具有消炎止癢及抗過敏之效能，可緩解皮膚之發炎症狀。
- (3)Nystatin：為抗念珠菌藥物，可用來治療由白色念珠菌和其他酵素類之黴菌引起之皮膚病症。
- (4)Neomycin及Gramicidin二種抗生素之配合不但具有更廣效性之殺菌作用，且對產生耐藥性之細菌，本配合之抗生素可具殺菌性。

適應症：濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染（念珠菌感染）。

用法及用量：將本軟膏塗擦於患處，每天二至三次。

注意事項：

- 1.不可用以點眼及在眼圍附近塗敷。
- 2.兩歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
- 3.濕疹、皮膚炎群、乾癬、掌趾膿疱症、燒傷症狀使用後如呈現浸潤、糜爛、結痂或產生二次感染者，應停用並立即就醫。
- 4.使用期間如出現搔癢、發紅、腫脹、丘疹或水疱等感染症狀時，應停用並立即就醫。
- 5.長期大量或大範圍使用時，可能出現等同副腎皮質荷爾蒙全身投與的不良反應。
- 6.孕婦：對於孕婦之安全性尚未確定，孕婦或可能懷孕之婦女避免使用，只有在潛在利益大於潛在的危險性的前提下才可使用。
- 7.授乳婦：尚未有足夠的實驗證據顯示此藥物會經由全身性吸收而分泌至母乳，授乳婦仍應慎用。

禁忌：

- 1.對Gramicidin，Nystatin，Neomycin具抗藥性及非感受性菌種所引起之皮膚症狀。
- 2.真菌、黴菌感染而帶有皮膚結核、疱疹、牛痘及水痘。
- 3.鼓膜穿孔之濕疹性外耳炎。
- 4.對本劑具過敏性者。

**副作用：**

- 1.皮膚感染症：有真菌症(白癬、念珠菌症)或neomycin，gramicidin，nystatin等具抗藥性或非感受性菌引起之感染症出現時，應停用並立即就醫。
- 2.長期使用時可能出現痊瘡樣發疹、皮膚炎、皮膚萎縮、紫斑、毛細血管擴張、多毛或色素消退等症狀時，應改換不含副腎皮質荷爾蒙之其他藥劑。
- 3.過敏性：時而出現皮膚刺激感或發疹，若症狀持續，應停用並立即就醫。
- 4.眼：使用於眼、臉部位時應注意可能引起眼壓高亢或青光眼。
- 5.大量且長期而廣範使用時，在密封法(ODT)下應注意可能產生對下丘腦-垂體-腎上腺軸的抑制作用。
- 6.長期使用：因可能出現胃障礙、耳腎毒性等副作用，應避免長期使用。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第021924號

包 裝：100公克以下鋁管裝。

100公克以下、450公克、1000公克塑膠瓶裝。

PIC/S GMP



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com