



PIC/S GMP 藥品  
(口腔用)

“杏輝”

**寧 康**<sup>®</sup>  
**NINCORT**

口內膠(安西諾隆)

Oral gel “*Sinphar*”  
(Triamcinolone)

本劑專為齒科口腔用之粘膜治療劑，其主要成分為類固醇荷爾蒙(Steroid Hormone)中具抗炎作用之Triamcinolone Acetonide加入口腔專用基劑，目的在以濕潤創傷面，使藥劑能有效的潤治傷處，本劑另有特點具粘著性，在口腔內抑制唾液的流出，故對於口腔內之各種炎症疾患能發揮治療效果。

成 分：每gm含：  
Triamcinolone Acetonide.....1mg

賦形劑：Castor Oil、Pectin、Peppermint Oil、Silicon Dioxide Colloidal、Hydroxypropylmethylcellulose、Butylated Hydroxytoluene。

適應症：齒肉、口腔粘膜、舌潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療，齒槽膿漏、假牙刺激部疾患。

用法用量：通常一日一次，最好於就寢時使用，症狀嚴重時，一日2~3次，適量塗佈於患處，使用後暫時避免飲食。

**注意事項：**

- 1.使用本劑後，若局部發生化膿性之感染時，請停止使用。若局部已發生結核性、濾過性或其他化膿性感染時請勿使用本劑。
- 2.本劑使用後發生過敏現象時請即停止使用。
- 3.使用本劑七天後患處若無顯著改善，須再就醫檢查。
- 4.凡結核病、胃潰瘍或糖尿病的患者，非經醫師指示不得使用本品。
- 5.本品由特殊基劑組成，與水份接觸易迅速硬化形成保護膜，故於使用上請務必留意以下幾點：
  - a.使用前請先洗手並確定雙手已擦乾。
  - b.避免管口與唾液或其他水份接觸，盡可能以無菌棉花棒沾取內容物塗抹於傷口。
  - c.開封後立即使用，於使用後馬上旋緊蓋子；開封後勿於空氣中暴露過久。
  - d.建議於封蓋前擠出少許內容物，以乾淨紙張擦拭管口周遭及多出於管口外之內容物後，立即旋緊蓋子。
  - e.若有擠不出來情形時，用瓶蓋刺穿器將鋁管口刺深一點，使開口擴大即可擠出。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第021981號

包 裝：1000公克以下鋁軟管、塑膠罐、積層鋁管裝。

儲 藏：25°C以下保存，避免日光直射及受潮，並置放於兒童不易取得之處。



杏輝藥品工業股份有限公司  
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號  
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN  
消費者服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com

IO-230-06