

“應元” 必康 眼藥水 0.5%

PICON Eye Drops 0.5% “Y.Y.”

Tropicamide 是一種抗蕁毒素劑(Antimuscarinic agent)，其作用與 Atropine 類似，但在睫狀肌麻痺及散瞳作用方面則具有較快的起始及較短的持續時間。散瞳作用在使用後 15~20 分鐘內產生，並且通常可持續約 7 小時。睫狀肌麻痺作用在使用後約 20 分鐘達到最大並且持續時間短，可在 2 至 6 小時內使調節完全恢復正常。

【成分】 Each ml contains:

Tropicamide 5mg

賦形劑：

Boric Acid · Sodium Chloride · Disodium Ethylenediamine Tetraacetate · Methylparaben · Propylparaben · Hydrochloric Acid · Water for Injection ·

【特點】

- 1.本品為 0.5% 溶液，係作為散瞳之用，使用後約 20 至 25 分鐘即可達最大之散瞳作用，並且可保持效果約 15 分鐘。如欲維持睫狀肌麻痺作用時，可於 20~30 分鐘後再滴一滴。
- 2.本品恢復快，患者可於 2~4 小時內恢復眼睛調節功能，並通常於 6 小時內可完全恢復。
- 3.本品不論虹膜之顏色為何均有效。

【適應症】

散瞳及睫狀肌麻痺。

【副作用】

有時可能發生暫時性刺痛感覺。

【注意事項】

與任何其他之散瞳劑相同，當眼壓增高或眼壓不明或眼內前房淺時宜小心使用。
當驗光(屈光)，需要睫狀肌麻醉作用延長時，只需要另外附加一滴即可。

【禁忌】

房角狹窄性青光眼(narrow angle glaucoma)患者禁忌使用。

【用法用量】

用於檢查眼底，於檢查前 15~20 分鐘，將藥水滴入一滴或二滴即可。

本藥須由醫師處方使用

【包裝】

100ml 以下塑膠瓶裝。

【保存】

於室溫中保存之即可，不要放於冰箱或高溫度之環境中。瓶蓋請蓋緊。



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL: (06) 2654883 (代表號)