

⑤

修訂日期：2019年1月1日

內衛藥製字第010577號

皮膚用腎上腺皮質荷爾蒙製劑

臨得隆® 乳膏

RINDERON® -V CREAM 0.06%

臨得隆乳膏為乳膏用乾性雪花膏型之基劑。

【成分】

有效成分及含量（1g中）為Betamethasone valerate 0.6mg（相當於Betamethasone 0.5mg）。

其他成分（賦形劑）：White vaseline、Liquid paraffin、Cetanol、Polyoxyethylene stearyl ether、Butylparaben、Methylparaben、Phosphoric acid、Sodium phosphate monobasic、Sodium hydroxide、Purified water。

【用途（適應症）】

濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1)有深部皮膚組織感染的人。
 - (2)3歲以下。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - (1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2)要使用於臉部。
- 其他使用上注意事項：
 - (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2)避免陽光直射。
 - (3)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (4)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 - (5)本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
 - (6)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (7)使用本藥前應徹底洗淨雙手。
 - (8)本藥不可連續使用超過7天。
 - (9)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 - (10)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 - (11)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
 - (12)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
 - (13)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

- (14)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
- (15)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

【用法用量】

塗於患部。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢等、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群（如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）。繼發性腎上腺功能不足（如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有上述外之其他不適情況發生。
- (2)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】

100公克以下鋁軟管裝。

【儲存條件】

儲存於30°C以下。

【類別】

醫師藥劑生指示藥品。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司

台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
電話：(03)9581101(代表號)



10-1900-05