

金貝比[®] 嬰兒洗劑

SINBABY Baby Lotion “Sinphar”

一般皮膚外用劑
(General Dermatitis Preparations)

特點：

1. 具保護皮膚之作用，Zinc Oxide使皮膚收斂，保持乾燥。Silicone Oil能於皮膚表面形成保護膜，防止汗及皮膚排泄物刺激皮膚。
2. 止痛及清爽之功效：嬰兒發疹易受排泄物刺激而發癢，而本劑 Dibucaine Hydrochloride可止痛，Camphor有清爽之功效。
3. 止癢之作用：Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對由疥子引起之皮膚搔癢具功效。
4. 殺菌作用佳而安全：Benzalkonium Chloride殺菌力佳較無毒性，使用安全。

【成分】

有效成分及含量：每 gm 含：

| | |
|------------------------------|-------|
| Zinc Oxide..... | 100mg |
| Diphenhydramine..... | 5mg |
| Dibucaine Hydrochloride..... | 1.5mg |

其他成分 (賦形劑)：

Camphor、Benzalkonium Chloride 50% Solution、Silicone Oil、Liquid Petrolatum、Polyoxyl 40 Stearate、Cetyl Stearyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose、Eucalyptus Oil、Menthol、Propylene Glycol、Perfume(Ireine)、Water Purified

【用途 (適應症)】 緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。

【使用上注意事項】

- 1、有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏。
- 2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 有深部皮膚組織感染。
- 3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 2歲以下兒童。
- 4、其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 兒童需於監護者的指導與監督下使用。
 - (3) 避免陽光直射。
 - (4) 勿超過建議使用量或使用次數。
 - (5) 使用部位或其周圍發汗時，請洗乾淨後再用藥。
 - (6) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (7) 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
 - (8) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
 - (9) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 - (10) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (11) 患部有下列狀況者，建議不要使用。
 1. 有傷口或紅腫。
 2. 傷口流膿或潰爛。

【用法用量】 一日2至3次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。

【警語】

- 1、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用 |
|------|------------------|
| 皮膚 | 發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮。 |

2、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有上述外之其他不適情況產生。
- (2)連續使用7天後症狀沒有改善或更惡化

【包裝】4000公克以下塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】25°C以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。

衛署藥製字第020215號



PIC/S GMP

® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website : <http://www.sinphar.com>