

“信東”淨菸 經皮吸收戒菸貼片2.08毫克／平方公分 (尼古丁) 5號、10號、15號

Smokfree Nicotine TDDS 2.08mg/cm² (Nicotine) No.5 No.10 No.15

【藥品說明】

本藥含有尼古丁成分。

【成分】

有效成分及含量：每5cm²的“淨菸”中含有10.4mg的尼古丁。
每10cm²的“淨菸”中含有20.8mg的尼古丁。
每15cm²的“淨菸”中含有31.2mg的尼古丁。
其他成分(賦形劑)：Methyl Salicylate、Isopropyl Myristate、
Butylated Hydroxytoluene、
Polyacrylate Solution。

【用途(適應症)】

幫助戒菸。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - 1.曾因本藥成分引起過敏的人。
 - 2.孕婦。
 - 3.曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 1.有心臟疾病的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 1.可能懷孕婦女以及哺乳婦。
 - 2.首次使用。
- 其他使用上注意事項：
 - 1.當使用本藥時，絕對禁止吸菸，以免造成尼古丁過量而發生中毒現象。
 - 2.使用本藥不宜超過三個月，因為有可能因過長時間吸收貼劑中的尼古丁而造成對尼古丁成癮。
 - 3.因為尼古丁具揮發性，若打開後放置太久將失去其效力(strength)，故由鋁箔袋中取出本藥後，需即刻使用，否則請將本藥保存在鋁箔袋中。
 - 4.本貼片膚色底層為鋁箔材質，若貼片使用期間需要進行磁振造影(Magnetic Resonance Imaging, MRI)掃描檢查時，請於檢查前撕去本貼片，以避免於MRI掃描過程中因過熱而造成皮膚灼傷。
 - 5.當使用完本藥後，必須將其對摺後丟棄，以免讓孩童拿去玩耍。
 - 6.當您用完本藥之後，請馬上用清水洗手。
 - 7.請至少一星期内都不要再將本藥貼在您已經貼過的部位，並且請勿將同一貼片貼超過24小時。
 - 8.水分對本藥並不會構成傷害，故洗手或洗澡時可不必撕下，但不可用力擦洗貼有本藥之部位，以免脫落。
 - 9.若本藥不慎脫落時，您可以馬上換貼一塊新的，然後在您平常更換本藥的時間撕下。
 - 10.當您首次使用本藥時，若皮膚發生輕微的發癢、發熱或刺痛現象是正常的，此症狀應於1小時內就會消失。在您撕去本藥後，原先貼有本藥的皮膚可能會稍微紅腫，於一天後紅腫即應消失。

【用法用量】

本藥雖有助於戒菸者消除菸癮，但除使用本藥戒菸外，個人戒菸的意志力亦很重要。

本藥經皮吸收戒菸貼片的使用劑量如下表所示：

週數	貼劑大小	健康戒菸者	特殊戒菸者*
2-8週	15 cm ² × 1	12.5 mg/day	—
2-4週	10 cm ² × 1	8.3 mg/day	8.3 mg/day
2-4週	5 cm ² × 1	4.2 mg/day	4.2 mg/day

* 體重低於45.5kg的人、每天吸菸量少於10支者、患有心臟血管疾病者。

【使用說明】

- 使用方法
 - 1.依箭頭指示 "撕開處" 將鋁箔袋撕開，取出方型膚色貼片。
 - 2.透明塑膠襯墊中央波浪紋面朝上，從中央扳開塑膠襯墊。
 - 3.左手固定貼片，右手先撕開一邊襯墊，並將膚色面朝上。
 - 4.內有粘膠部份，貼在頸部以下至腰部，乾燥、乾淨無毛髮處，如手臂、胸部或腹部。固定一部分貼片，再撕開另一邊襯墊，用力壓住10秒。
 - 5.貼24小時後，請取下貼片對摺後丟棄，每天需更換黏貼部位。

【警語】

- 1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	較常發生皮膚紅腫或刺痛感，但在短時間內，此症狀即可消失。
神經系統	戒菸後的症狀：神經質、易怒、不安、憂慮、睡眠不安定、注意力不集中、食欲及體重增加、頭痛、肌肉痛、便秘及疲勞等。

- 2.使用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
如(1)血壓上升、心跳加快、心絞痛。
(2)有上述之外其他不舒服的狀況發生。

【包裝】

5.10、15平方公分／片／鋁箔袋裝，100片以下盒裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存條件】

因為戒菸貼劑對熱敏感，故請將本藥儲存於25°C以下。本戒菸貼劑若出現輕微的褪色情形，對貼劑品質無嚴重影響，請安心使用。切記，在夏天的太陽照射下，車內的溫度可能遠高於30°C。

衛署藥製字第038646號

諮詢專線：0800-231525



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號