

“麥迪森”**雅托平** 眼藥水 0.125%

Tropine Eye Drops 0.125% "MEDICINE" (Atropine Sulfate)

【說明】

本品是一種無菌使用於眼部之局部抗乙醯膽胺作用劑。

【成份】

Each mL contains:

Atropine Sulfate.....1.25mg

賦形劑：Sodium Chloride, Benzalkonium Chloride 50%, Boric Acid, Sodium Borate, Hydroxypropylmethylcellulose 606, Hydrochloric Acid, Distilled Water

【臨床藥理】

本品是一種anticholinergic劑，由節後膽鹼神經直接作用於平滑肌和淚腺，它們的藥理作用是由於阻止乙醯膽胺的類副交感神經作用。

【適應症】

散瞳、睫狀肌麻痺。

【禁忌】

- 1.本品不能用於青光眼，或者有窄角性青光眼傾向之病人。
- 2.本品不能用於先前對atropine產生嚴重全身反應之小孩。

【警告】

過量使用於小孩和對某特定過敏體質者，可能會產生全身中毒症狀時，應停止使用和使用適當藥物，如述於“過量”部分治療。

【注意事項】

本品應置於小孩拿不到的地方。

【致癌性、突變性、不孕症】

還沒有產生這些病例之研究報告。

【懷孕婦女】

- 1.本品還未做動物生殖研究，也不知道是否能夠造成胎兒傷害，或影響生殖能力。
- 2.本品可應用於孕婦(僅當清楚需要時)。

【幼兒】

請看禁忌和警告部分。

【副作用】

- 1.長久使用時可能引起全身反應，眼瞼過敏反應，局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或者皮膚炎。
- 2.使用時，會有畏光及近距離調節力不足之現象。

【過量】

一般症狀和atropine中毒症狀，包括：口乾、皮膚過敏、發燒、精神錯亂、心悸、臉部發紅，如果有過量現象，應使用水或0.9%食鹽水沖洗，必要時可用縮瞳劑。

如果意外攝取時(吞食時)：

- (1)使用4%單寧酸使之嘔吐或洗胃。
- (2)使用5mg之毛果芸香鹼(Pilocarpine)口服直至口濕潤為止(必要時間隔投與)。

假如需要全身支持措施時：如下

- (1)呼吸衰竭時：氧氣筒和人工呼吸。
- (2)尿液滯留時：插入導管導尿。
- (3)發燒：用酒精擦拭。

當用於已用短作用之Barbiturates鎮靜劑為控制刺激(Excitement)狀態時，須非常小心。

【其他注意事項】

- 1.於保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。
- 2.開瓶注意事項：產品於開啓使用前，先以順時針方式往下旋緊一圈後再逆時針轉開瓶使用，以利藥液滴出。

【劑量及使用方法】

A.用於睫狀肌麻痺性折射(屈光)時：

局部用於結膜，1天1~2次，每次1滴。

(1)嬰兒(大至1歲)：使用濃度：0.125%，或由醫師指示使用。

(2)小孩(1至5歲)：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。

(3)小孩(5歲和大於5歲，且是藍虹膜者)：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。

(4)小孩(5歲和大於5歲，且是暗虹膜者)：使用濃度：0.5%或1%，或由醫師指示使用。

B.用於葡萄膜炎時：局部用到結膜，使用濃度：0.125%至1%，1天1~3次，每次1滴。

C.用於手術後瞳孔放大時：局部用到結膜，使用濃度：0.5%或1%，1天1~3次或由醫師決定，每次1滴。

D.本藥限由醫師使用。

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫環境或冰箱中，瓶蓋應蓋緊。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

100 mL以下塑膠瓶裝。

衛署藥製字第052569號



委託者：麥迪森醫藥股份有限公司
製造廠：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠
桃園市桃園區桃鶯路445-2號
ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO., LTD.
No.445-2, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)