



抗濾過性病毒劑

VLO-005 外用
衛署藥製字第032684號

永信

剋庖乳膏

(艾賽可威)

5%



VIRLESS

(Acyclovir)

Cream 5%
Yung Shin

1.82cm

病毒對於自然界中不論動物、植物及人類而言，都是相當令人困擾的小東西，其頑強的生命力及致病力幾乎讓人有束手無策之感。

永信的剋庖乳膏，可說是濾過性病毒的剋星，其主要成分Acyclovir，對被病毒感染之細胞，有很理想的治癒效果，係在千呼萬喚中不斷的研究及設計才開發出來，祈盼能提供臨床上受病毒感染之患者新的福音。

【成分】每公克中含：

Acyclovir.....50mg

【賦形劑】

Methyl Paraben、Propyl Paraben、Stearic Acid、Spermaceti、Cetyl Alcohol、Fractionated Coconut Oil、Dimethylpolysiloxane、Sorbitan Monostearate 60、Propylene Glycol、Polysorbate 60、Sodium Citrate、Bouquet G12481、Purified Water。

【特徵】

1. 本藥能選擇性的作用於受virus(病毒)感染的細胞上，因Acyclovir要產生抑制病毒DNA合成的作用之前，必須先被磷酸化(phosphorylation)轉變成Acyclovir Triphosphate，而此磷酸化的第一步須在病毒本身所特有之Thymidine kinase存在之下才會進行，故對於未受病毒感染的正常細胞則不會發揮作用。
2. 本藥毒性相當低，故可優先採用及選擇來治療病毒性感染。
3. 本藥可阻止病毒在寄主細胞中複製，而加速治癒作用及快速緩解疼痛。
4. 本藥經生體外試驗，對於單純疱疹病毒types I 及 II 及水痘帶狀疱疹病毒均有很高的抗病毒活性，而且對哺乳動物的毒性很低。

【適應症】

由單純疱疹引起之感染。

【用法·用量】

取出適當量塗抹於患處，每3小時一次，一天6次，連續7天。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 對本藥過敏之患者，禁忌使用。
2. 本藥僅供皮膚方面使用，勿用於眼睛及其四周。
3. 本藥使用之劑量，次數及治療時間請勿超過推薦之用法·用量。
4. 本藥與其他局部或全身性作用藥物併用，並無交互作用產生。
5. 無資料指出使用本藥對懷孕婦女及胎兒之影響，也無資料指出，使用本藥後乳汁中Acyclovir之濃度。故孕婦及授乳婦宜衡量利弊使用之。
6. 副作用：使用本藥後，可能發生短暫之灼熱感或刺痛，有小部份之病患曾有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落之報告。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

1000gm以下軟管裝、罐裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2146363