

急慢性腎功能不全用之氨基酸製劑

“信東” 胺美樂-爾福 注射液

**Aminol-RF INJECTION “S.T.”**

組成：每 ml 中含：

L-Isoleucine·····	7.20mg	L-Threonine·····	5.15mg
L-Leucine·····	11.25mg	L-Tryptophan·····	2.55mg
L-Lysine Acetate·····	11.55mg	L-Valine·····	8.20mg
L-Methionine·····	11.25mg	L-Histidine·····	5.60mg
L-Phenylalanine·····	11.25mg	Sodium Bisulfite·····	0.80mg
Total Amino Acide·····	74.00mg		
Total Nitrogen·····	9.00mg		
滲透壓比（對生理食鹽水之比）	約 2		

**適應症：**

急、慢性腎功能不全患者之氨基酸補給。

**用法·用量：**

- (a) 慢性腎功能不健全患者：通常成人一日一回 200ml，緩慢靜脈點滴輸注。投與速度約 200ml/2~3 小時（即 15~25 滴/分）小孩、老人或嚴重病患者之投與速度更要減緩。  
施行透析療法時，可在透析終了之前 90~60 分時，由透析回路之靜脈側注入本劑。
- (b) 急性腎功能不全患者：通常成人一日 200-400ml 緩慢靜脈點滴輸注。或者依高能量輸注液法，以持續點滴注入中心靜脈內、依年齡、症狀、體重適宜增減之。本藥限由醫師使用。

**注意：**

- (1)一般注意：在下列情況下投與本藥
- (a)嚴格執行低蛋白質食療法患者之急性增惡期。
  - (b)透析患者需要較多量之氨基酸時。
  - (c)經口無法或難以攝取營養之患者。
- (2)禁忌：肝性昏睡或恐有肝性昏睡之患者。
- (3)慎重投與：
- (a)嚴重酸中毒患者。
  - (b)充血性心機能不全之患者。
- (4)副作用：
- (a)偶有發疹等過敏現象發生時，隨即中止用藥。
  - (b)消化器：有惡心、嘔吐等現象發生。

- (c)循環器：偶有胸部不快感、心跳加快等症狀發生。
  - (d)大量，急速投與：可能造成酸中毒。
  - (e)其它：有時會有惡寒、發熱、頭部灼熱感、頭痛、血管疼痛之現象發生。
- (5)使用上注意：
- (a)含有  $\text{Na}^+$  離子 10mEq/L，大量使用時或與其它電解質合用時，應注意其均衡。
  - (b)緩慢靜脈注射。
  - (c)使用本劑時，依下列原則給予食物蛋白質與熱量。
    - (i)慢性腎功能不全患者，本劑 200ml 注射後其食物蛋白質量可減少 5~10gm 之供給，但需要有 1800Kcal 以上之熱量供給。
    - (ii)經口無法或難以攝取營養之急性腎功能不全患者；依高能量輸注法投與時，其 Calorie：N = 500~1000。
- (6)其它：當有結晶析出時，以 50~60°C 之溫度使之溶解，再冷至體溫相近即可使用。
- (7)使用之注意事項：
- (a)取用時：
    - (i)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
    - (ii)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
  - (b)輸液套選用及插入法：
    - (i)請依輸液套使用方法正確使用。
    - (ii)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割（coring）產生碎片。
    - (iii)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

### 包裝：

玻璃瓶裝：100ml, 200ml, 300ml, 500ml

衛署藥製字第 027090 號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路 22 號

IA 048 ©