



永豐藥品

4-032-37-9(4)

**安博黴素<sup>®</sup>注射劑 500公絲**  
**AMPOLIN<sup>®</sup> Injection 500mg**

安博黴素注射劑一種新的廣泛性合成Penicillin製劑，不但對革蘭氏陽性菌有顯著療效，同時對革蘭氏陰性菌亦有效，為一種療效正確之卓越注射用抗生素製劑。

成 分 每小瓶含有：

Ampicillin Sodium ..... 500mg(力價)

特 點 以IM方式使用時，易達到血中最高濃度，且保持時間長久，約可達6小時。

適 應 症 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他對青黴素具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量 通常成人一回250~500mg一日2~4次肌注，小兒體重在20kg以下，以25~60mg(力價)/kg(一日量)計算，分3~4次肌注或靜注，限由醫師使用。依年齡、症狀、劑量加以適當增減之，下列用法用量可供參考。

**呼吸道、皮膚及軟組織感染方面**

如：肺炎、支氣管炎、膿毒性咽喉炎、喉炎、中耳炎、膿皮症及皮膚感染症、外傷感染症、丹毒、淋巴管炎、蜂窩組織炎。

成人：250~500mg每6小時注射一次。

小孩：體重50kg以下，每日25~50mg/kg計算，分成四次，每6小時注射一次。

**泌尿生殖感染症方面**

如：尿道炎、產褥膿毒病、淋病。

成人：250~500mg每6小時注射一次，每日四次。

小孩：體重40kg以下者，一日量以25~50mg/kg計算，分成四次，每6小時注射一次。

**由N. Gonorrhea 感染引起之尿道炎**

成人：500mg每12小時注射一次。

**細菌性腦膜炎**

成人：8~14gm/day。以I.V.點滴治療之。

小孩：100~200mg/kg/day。

此類以I.V.點滴方式給藥，併以每3~4小時用I.M.方式給藥。



永豐藥品

4-032-37-9(4)

**注意事項 有Penicillin過敏症前歷之患者不宜服用本劑。**

在治療中有非感受性微生物(Aerobacteria aerogenes, pseudomonas,candida)之過度繁殖症狀出現時，應立即停藥，改用適當之療法代替之。

治療期間應定期作肝、腎及造血機能檢查(尤其是兒童及嬰兒)。

**使用法注意**

**I.M. 肌注用**

250mg/vial以注射用水1.0ml溶解，500mg/vial以注射用水1.8ml溶解，1000mg/vial以注射用水3.5ml溶解，全部抽出，並須在一小時內用完。

**I.V. 靜注用**

250mg/vial，500mg/vial以注射用水5ml溶解，1000mg/vial以注射用水7.4ml溶解，全部抽出，並須在1小時內用完。

**I.V. 點滴用**

Sodium ampicillin溶於下列注射液，而用於I.V.點滴時，則其安定性往往有下列之變化(稀釋成2mg/ml及30mg/ml)。

品 名	時 間	Activity 損失率
(1) Isotonic sodium chloride	8 小時	-10%
(2) 5% dextrose	4 小時	-10%
(3) 5% dextrose in 0.4% sodium chloride solution	4 小時	-10%
(4) 10% Invert sugar	4 小時	-10%
(5) M/6 sodium lactate solution (in 30mg/ml)	4 小時	-10%

包 裝 500mg 小瓶裝/100支以下盒裝。

衛署藥製字第001853號

◎ 永豐化學工業股份有限公司  
**Y F CHEMICAL CORP.**  
 新北市新莊區新樹路292號