

水份・營養・電解質的補充液

# “南光”利兒注射液

## Babysalt Injection "N.K."

急性下痢、激烈嘔吐、霍亂.....等等，均會引起身體喪失大量的水份，因此必須及時補充或維持正常量的水份，以彌補鹽的過度損失，所以，本品可謂是一種rehydrating solution。

成分：Each ml contains:

Dextrose .....	50 mg
Sodium Chloride.....	3.3 mg

賦形劑：Water for Injection。

製劑特性：

Dextrose Monohydrate ---- 5 % (w/v)	Na <sup>+</sup> ---- 56 mEq/L
Sodium Chloride ---- 0.33% (w/v)	Cl <sup>-</sup> ---- 56 mEq/L
Osmolarity ---- 365 mOsm/L	Calories ---- 170 Cal/L

不含抗微生物劑

臨床應用優點：

不論下痢之原因、病人之年齡、血清之鈉濃度，理想的補充液內所含之鈉離子濃度，應該是50~90 mEq/L，而一般90 mEq/L是較適用於霍亂所引起之下痢，但其只對成人、小孩適用，嬰兒可能不宜。嬰兒其合適的濃度為50~60 mEq/L。因此，這類製劑有兩大特點：

1. 較低的鈉含量。
2. 不需再投與額外的水。

本品因僅含56 mEq/L的鈉離子，故亦適用於嬰兒。

適應症：

鈉、氯離子電解質之補充，脫水時水份補充，體內葡萄糖、熱能之補給。

用法用量：本藥限由醫師使用。

通常靜脈輸注1000 ml，可視實際需要酌予增減。

注意事項：

一、取用時：

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
  - 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，  
插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
  - 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。
- 儲 藏：本品應於25°C以下貯存。
- 包 裝：100, 300, 500, 1000毫升玻璃瓶、塑膠瓶，塑膠軟袋裝，100  
支以下盒裝。
- 衛署藥製字第 029108 號 G.M.P.: G-0406

122413-01  
26200000000244



南光化學製藥股份有限公司  
台灣・台南市新化區中山路1001號  
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845