

利達平注射液 240 萬國際單位 Retarpen 2,400,000 I.U. for Injection

衛署藥輸字第 016989 號

成份：

Each Vial Contains：

Benzathine penicillin G (1170IU/mg)

Parenteral (1.2%) lecithinized milled 2,400,000IU (equivalent to 2.0513g)

Each ampoule of solvent contains：

Water for injection 5ml

性質：

對青黴素敏感菌藉由抑制其細胞壁之黏膜(Mucopeptides 之合成而達到殺菌之作用)。

本品為最長效之貯存式慢慢釋出之青黴素，肌肉注射後青黴素慢慢的被釋出至血液中。

依本品動力學得知對密螺旋體，除了 D 群外之鏈球菌及除了產生青黴素外之葡萄球菌很有效。

適應症：

對青黴素具有感受性菌所引起之感染症。

說明：

本品對毒素，其他螺旋體(如熱帶梅毒，品他病)具高效。

本品最好能與快速吸收之青黴素(例如 Sodium Penicillin G. 或本公司產品歐施臨，做為治療急性之扁桃腺炎，猩紅熱，丹毒及傷口感染等。

單獨使用做為預防風濕熱，猩紅熱及丹毒。

在扁桃腺切除及拔牙為預防感染時最好與其他快速吸收之青黴素(例如 Sodium Penicillin G. 或本公司產品歐施臨等)配合使用。

副作用：

對立即過敏反應，蕁麻疹，發燒，關節痛，血管神經性水腫，多型紅斑，滲出性皮膚炎等副作用應予注意。

在治療梅毒時因其會釋出內毒素可能會發生 Jarisch-Herxheimer 之反應，在注射青黴素後可能有口腔炎及舌炎。

對有抗性之菌或真菌於長期應用時須注意其過渡生長，在超感染發生時應予以適當的處理。

在嬰兒可能有局部之反應發生。

藥物互相作用：

併發症鎮痛消炎劑，抗風濕，止痛劑(特別是 Indomethacin, Phenylbutazone, Salicylas)會產生競爭性的排泄抑制。

殺菌之青黴素不應與抑制細菌性抗生素合用，除非有相乘或相加之作用產生，而合併時其劑量應給予各別成份之全量，除了有相乘效果時可將毒性較高之劑量減少。

配合禁忌：

已知過敏者，與 Cephalosporines 會有交叉敏感性。

在過敏病人使用時應注意，輕微感染不必使用本品。

用法用量：(本藥限由醫師使用，須作過敏試驗，如有過敏者不得使用)

成人使用治療梅毒：

(a) 早期梅毒~1 次 1~2 劑，分二注射位置注射。

(b) 中期梅毒~1 次 2 劑，分二注射位置注射，在臨床症狀再出現或實驗室診斷仍為正時可重複給予使用注射。

(c) 晚期梅毒~每週 1~2 劑，使用超過 3~5 週。

治療熱帶梅毒：

孩童 1/4~1/2 劑肌肉注射

而接觸者，潛伏感染者應投予半量。

本品他病之治療：

孩童：1/2 劑，肌肉注射。

成人：1 劑，肌肉注射。

急性扁桃腺炎，猩紅熱，丹毒，傷口感染：

小於 12 歲孩童：1/4 劑，依感染之嚴重性或每 3 天注射一天。

成人：1/2~1 劑，每週肌肉注射一次。

於急性感染期與快速吸收之青黴素製劑(如 3,000,000 單位之 Sodium Penicillin G. 或歐施臨)同時投予後繼續以利達平治療。

預防風濕熱或風濕性心內膜炎：

小於 12 歲之孩童：1/4 劑，每週一次。

成人：1/2~1 劑每 4 週一次。

預防猩紅熱或曾暴露於猩紅熱危險下之人：

孩童：1/4 劑，每週肌肉注射一次。

成人：1 劑，肌肉注射。

預防鏈球菌感染(丹毒)：

孩童：1/4 劑，每 2 週肌肉注射一次。

成人：1 劑，肌肉注射。

在拔牙、扁桃腺切除及小開刀預防感染時最好與能快速吸收之青黴素(例如 Sodium Penicillin G. 或歐施臨)同時投予：

孩童：1/4 劑，肌肉注射。

成人：1/2 劑，肌肉注射。

於孩童大開刀預防感染時：1/2 劑每 7~14 天肌肉注射一次，直到癒合為止。

使用時應注意：

應注射於上，外 1/4 之大臀肌上以避免注入血管，在注入前請將針筒抽一下以確定之。

如須重覆注射則注射部位應予改變。

使用前請振搖均勻。

注意事項：

糖尿病者應特別注意~本品為肌肉注射緩慢釋出之貯存型態。

在過敏出現時應予停止，並給予 adrenaline, antihistamine 和可體松類。

如不小心注入水管則有：短暫的抑鬱，焦慮和視覺干擾(Hoignes Syndome)。

在性病梅毒被懷疑時應於投藥前以暗視野或血清學方式來檢查，如確定，應至少治療 4 個月。

本品不可由皮下，靜脈，腰椎或其他體腔注入。

病人應知道之資料：

如過敏或皮膚症狀(過敏)發生時(如臉或其他部份之腫大)。

應找醫師，並應告知其他之副作用。

貯存：

於適當情況下在有效期內能保有全部力價，且不溶解掉。

包裝：

240 萬國際單位小瓶裝，100 小瓶以下盒裝各附等支數 5 公撮安瓿裝溶劑。

製造廠：奧國生化大藥廠

Biochemie Ges. M.B.H.

6250 Kundl/Austria

交貨商：台灣傳富國際有限公司

地 址：台北市 110 忠孝東路 5 段 410 號 13 樓之 3