

Ceft-S Ceft-S Ceft-S

“生達”
賜 妥 靜脈注射劑
(西華瑞隆)
Ceft-S for I.V.Inj. "Standard"
(Ceftriaxone)

警 語：

(1) 未滿28(≤28)天的新生兒正以靜脈注射方式接受含鈣藥品及營養品，則這些新生兒不應再授予Ceftriaxone成分之注射劑；(2) 大於28(>28)天以上的病人，可以相繼使用含Ceftriaxone與含鈣藥品，但是輸注管必須完全以可相容的溶液沖洗；(3) Ceftriaxone與含鈣藥品不應以Y型管同時授予病人；(4) 因為Ceftriaxone-calcium沈澱發生於大於28(>28)天以上的病人之風險很小，因此這些病人可以同時使用Ceftriaxone與含鈣產品，但必須遵循前述指示使用。另外不可以將Ceftriaxone與含鈣產品，包括Ringer's或Hartmann's溶液或非口服方式之含鈣營養品等混合使用。根據體外研究結果發現，如果遵循前述注意事項使用Ceftriaxone與含鈣溶液或其產品，發生Ceftriaxone-calcium沈澱的風險很低。(5) 目前並沒有資料顯示靜脈輸注Ceftriaxone與口服含鈣產品或肌肉注射Ceftriaxone與靜脈注射或口服含鈣產品之間不會發生沈澱。

“賜妥”注射劑是生達公司繼“賜達”注射劑後，開發完成之第三代頭芽孢菌素類抗生素，其殺菌作用主要是抑制細菌細胞壁的合成，作用時間長，抗菌範圍廣泛，對於各種G (+)及G (-)甚至厭氧菌感染均具優異療效。

主 成 份：每Vial含：
Ceftriaxone(Disodium 3 ± H₂O) ...0.25gm、0.5gm、1gm[力價]

特 性：1.作用時間長久，一天只需注射一次，病人順從性佳。
2.抗菌範圍廣泛，療效優異。
3.對大部份的 β-lactamases 具有高度的穩定性，細菌不容易產生抗藥性。
4.對其他抗生素已產生多重抗藥性之細菌，對 Ceftriaxone 仍具感受性。

適 應 症：葡萄球菌，鏈球菌，肺炎球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：成人每次：1-2 g，每天1次。嚴重感染可增加到4 g，分成二次，每次間隔12小時。
新生兒（至2週）：每日劑量20~50mg/kg，不要超過50mg/kg。
嬰兒和小孩（3週至12歲）：每日劑量20~80mg/kg，每天一次。
本藥限由醫師使用。

特殊劑量用法：

腦膜炎：嬰兒和小孩的細菌性腦膜炎，每天100mg/kg（不要超過4 g）。
腎衰竭（Creatinine clearance小於10ml / 分鐘）：一天劑量不要超過2 g。
老年性病人：無須調整劑量。
肝功能異常而腎功能正常：無須調整劑量。
腎功能異常而肝功能正常：無須調整劑量，但腎衰竭時，每天劑量不要超過2 g。

使用方法：本品調配後，於室溫下可維持物理化學穩定性約6小時，調配後要即刻使用，儲存時間較久，溶液會呈淡黃色至琥珀色，但不影響效價及耐受性。

靜脈注射：本品0.25公克，0.5公克溶於5 c.c.，1公克溶於10c.c.注射用蒸餾水，然後以2-4分鐘時間行靜脈直接注入。
靜脈點滴灌注法：點滴灌注5-15分鐘，灌注時，本品2 g溶於40ml下列不含鈣的點滴液：0.9 % NaCl、0.45 % NaCl + 2.5 % dextrose、5 %或10 % dextrose，5 % levulose，6 % dextran in dextrose，本品溶液請勿和其他抗生素或上述外的其他溶液混合使用。

禁 忌：1.本品不能使用於對Cephalosporins過敏的病人，對Penicillin產生過敏的病患，對本品亦可能產生過敏。
2.雖然實驗得知本品不會產生突變或畸型作用，但為了安全起見，懷孕婦女（尤其前3個月）除非病情絕對需要，否則請勿授予本藥。

注意事項：1.過敏性休克發生時，需立即行靜脈注射 epinephrine 然後 glucocorticoid。
2.生體外研究顯示本品和其他一些 Cephalosporins相同，能從血漿albumin中取代bilirubin，因此在hyperbilirubinemic新生兒，尤其是早產兒，使用本藥時要特別注意。

副 作 用：腸胃道(約2%)：稀便，下痢，頭昏，嘔吐，口內炎，舌炎。
血液學(約2%)：嗜伊紅血球增多，白血球減少，粒狀血球過少或溶血性貧血。
皮膚(約1%)：濕疹，過敏性皮膚炎、蕁麻疹、水腫、多形紅斑。

其他罕見的副作用：頭痛、眩暈、肝臟酵素增高，膽囊有小塊泥狀物，少尿，血中肌酐酸增高，生殖器官的黴菌症，發冷抖顫和過敏反應。極罕見的偽膜性腸炎和血液凝結疾病的副作用也曾報告過。

局部的副作用：僅有極少數的病人在靜脈注射後，血管壁有發炎的反應，此種作用可用緩慢（2~4分鐘）注射來避免。肌肉注射如無加入Lidocaine溶液則會產生疼痛感覺。

交互作用：1.和利尿劑如Furosemide併用不會影響腎臟功能，亦無證據顯示當本品與氨基糖苷抗生素併用時會增加氨基糖苷抗生素之腎毒性。
2.與酒精併用不會產生Disulfiram之副作用。
3.不會引起乙醇耐受性缺乏症狀及出血現象。
4.本品排泄不受Probenecid之影響。

賦形劑內容：無

儲 存：本品請存放於30°C以下，孩童不能接觸之地方。

包 裝：0.25gm、0.5gm、1gm X 1V，10Vial包裝。

衛署藥製字第039940號 G-5319 LT-IC18 2213660



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

50201