

"瑞安" 捷復 注射劑 500 毫克
1000 毫克
(西華崑隆)
"Purzer" Chef for Injection 500 mg
1000mg
(Ceftriaxone)

瑞安大藥廠股份有限公司 PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

衛署藥製字第034032號

本藥限由醫師使用

警語：

- (1) 未滿28(≤28)天的新生兒正以靜脈注射方式接受含鈣藥品及營養品，則這些新生兒不應再授予Ceftriaxone成分之注射劑。
- (2) 大於28(>28)天以上的病人，可以相繼使用含Ceftriaxone與含鈣藥品，但是輸注管必須完全以可相容的溶液沖洗。
- (3) Ceftriaxone與含鈣藥品不應以Y型管同時授予病人。
- (4) 因為Ceftriaxone - Calcium沈澱發生於大於28(>28)天以上的病人之風險很低，因此這些病人可以同時使用Ceftriaxone與含鈣產品，但必須遵循前述指示使用。另外不可以將Ceftriaxone與含鈣產品，包括Ringer's或Hartmann's溶液或非口服方式之含鈣營養品等混合使用。根據體外研究結果發現，如果遵循前述注意事項使用Ceftriaxone與含鈣溶液或其產品，發生Ceftriaxone-Calcium沈澱的風險很低。
- (5) 目前並沒有資料顯示靜脈輸注Ceftriaxone與口服含鈣產品或肌肉注射Ceftriaxone與靜脈注射或口服含鈣產品之間不會發生沈澱。

捷復注射劑為第三代廣效性頭孢子菌抗生素，對革蘭氏陽性及陰性菌種與綠膿桿菌均具療效。本品為無菌粉末注射劑。

【成分】

每小瓶(Vial)含
Ceftriaxone (as disodium).....500 mg或1000 mg
賦形劑：無

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。

經實驗得知捷復和氨基糖苷(Aminoglycosides)配合使用時，則增加效力或相乘效果。由於*Pseudomonas aeruginosa*和*Streptococcus faecalis*所引起的嚴重且有危險的感染，這種配合更為重要，但是這兩種藥必須分開授予。

【標準劑量】

成人和超過12歲的孩童其標準劑量為1~2公克，每天1次。在嚴重的感染或者是病菌對捷復的感受性僅是中等時，其劑量可能要增加，非常少數病例可能超過4公克。若授予劑量每天超過4公克時，就需分成二次，每次間隔12小時。

嬰兒及年幼的孩童則以每公斤體重20~80毫克每24小時1次，劑量則視感染的嚴重程度而定。治療的期限則因疾病的過程而不同。在病人退燒後，至少應繼續授予三天。建議使用配成的新鮮注射液。本溶液在室溫時，其效力最少可維持6小時(5°C時則可達24小時)。

捷復可以施於靜脈注射，或者短時間的靜脈灌注。

【靜脈注射】

靜脈注射時，0.5公克的捷復溶於5 mL、捷復1公克溶於10 mL的注射用(蒸餾)水，然後以2分鐘~4分鐘的時間行靜脈直接注入。

短時間靜脈點滴灌注法：短時間靜脈點滴灌注時以2公克的捷復溶於40mL的不含鈣的點滴液，如：0.9%生理食鹽水、0.45%氯化鈉+0.25%葡萄糖、5%葡萄糖、10%葡萄糖、5%果糖、葡萄糖內含葡萄糖聚醣6%。

灌注的時間在5~15分鐘。

溶液是呈黃色，這表示主成分的效力和藥的耐受性不變。

【特殊劑量用法】

早產的嬰兒每日的劑量不要超過每公斤體重50毫克。

老年人可適用成年人的建議劑量。假設肝臟的功能完整無缺，腎臟功能不好的病人，不需要降低劑量。唯有腎衰末期前的病人(Creatinine Clearance < 10mL/分)，則其劑量不得超過2公克。

若腎臟功能完整無缺，則肝臟功能不好的病人亦不需減低劑量。假使病人有嚴重腎和肝的衰竭，則應隔一段期間檢查血中捷復的濃度。在治療期間應隔一段時間做血液常規檢查。

【使用的限制】

對Cephalosporins過敏的病人。對Penicillin產生過敏的病患，對本品亦可能產生過敏。雖然從實驗得知本品不會產生突變或畸型之作用，但為了安全起見，在懷孕的婦女(尤其前三個月)除非病情絕對需要，請勿授予捷復。

【副作用】

全身性的副作用：使用捷復時可能有下述副作用產生(依每一器官發生的頻率，依遞減的方式排列如下)：

- 腸胃道：稀便/下痢、頭昏、嘔吐、口內炎、舌炎。
- 皮膚的反應：疹、過敏性皮炎、癢、蕁麻疹、水腫、多形紅斑。
- 血液變化：嗜伊紅血球增多、血腫或出血、血小板減少、白血球減少、粒狀血小板過少或溶血性貧血。
- 其它稀有的副作用：頭痛、眩暈、肝臟酵素增高、少尿、血液中Creatinine增高、生殖器官的黴菌病、發冷抖顫和過敏反應。上述的副作用均為可逆反應，只有某些情況需要停藥。和其它的Cephalosporins一樣，過敏性的休克亦可能發生，它需要立刻地處理。

局部的副作用：僅有極少數的病人在靜脈注射後，血管壁有發炎的反應，這種副作用可以緩慢(2~4分鐘)注射來避免。

藥品的相互作用：

- 以大劑量的捷復和利尿劑如Furosemide併用並不影響腎臟的功能。
- 和氨基糖苷(Aminoglycosides)一起使用，並無拮抗現象發生。
- 特別是無跡象顯示捷復會增加Tobramycin對腎臟的毒性。
- 喝酒後的病人使用捷復，不會產生如使用Disulfiram所引起之副作用。
- 捷復不干擾膽紅素蛋白的結合力。
- Probenecid 不會影響捷復之排泄。

【儲存條件】

本品存放於30°C以下。

【包裝種類】

500 mg、1000 mg /小瓶，100支以下裝。

委託者：瑞安大藥廠股份有限公司
地址：台北市內湖區內湖路一段392號11樓之1
服務電話：(02)87977100
製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠
地址：台南市新市區中山路182號